

Direttive per la frutticoltura integrata 2026

36^a edizione

Editore:

AGRIOS

Gruppo di lavoro per la frutticoltura integrata dell'Alto Adige
Casa della mela, via Jakobi 1A, I-39018 TERLANO (BZ), Italia

DIRETTIVE PER LA FRUTTICOLTURA INTEGRATA



Queste direttive da un lato sono raccomandazioni tecniche, mentre dall'altro sono veri e propri impegni, che devono essere adempiuti per ottenere la certificazione. Per una chiara identificazione questi ultimi sono stampati in caratteri di colore rosso ed inoltre sono evidenziate con un punto esclamativo rosso.



L'AGRIOS nei capitoli successivi propone al produttore diverse pratiche colturali ecologiche. Questi sono stampati in caratteri di colore azzurro ed inoltre sono evidenziate con un punto esclamativo azzurro.

Definizione ed obiettivi della frutticoltura integrata

Per produzione integrata si intende quel sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i metodi e mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici.

La frutticoltura integrata è il metodo **economico** per produrre **frutta d'ottima qualità** rispettando la **salute** dell'uomo e l'**ambiente**.

La promozione d'adeguate cure colturali agronomiche ed un impiego ridotto di prodotti agrochimici rappresentano lo scopo principale della produzione integrata.



Durante **un'annata agraria** il frutticoltore deve adottare **almeno due di queste pratiche colturali** consigliate nella lista indicata nel quaderno di campagna, in cui esse devono esser segnate.

PRODUZIONE INTEGRATA NELL'AZIENDA AGRICOLA

Agricoltori formati professionalmente e consci dal punto di vista ecologico

La prerogativa più importante della produzione integrata è una buona **preparazione tecnica** ed un **atteggiamento positivo** del conduttore aziendale nei confronti dell'ambiente e del consumatore. Perciò l'AGRIOS rende chiaro il programma ai produttori tramite circolari e relazioni e informa i partecipanti sullo sviluppo della produzione integrata.

Per realizzare un idoneo programma integrato è necessaria una valida **consulenza** tecnica indipendente ed un'intensa **sperimentazione** pratica. Infine anche i responsabili della **commercializzazione** della frutta devono fare bene la loro parte per la buona riuscita del programma integrato.

I produttori devono essere competenti ed avere o una formazione professionale specifica oppure esperienza professionale minima di cinque anni.



Inoltre devono documentare che tutte le superfici coltivate secondo le direttive per la frutticoltura integrata fanno capo ad un'organizzazione di consulenza. Qualora siano soci di un'organizzazione di produttori, la stessa, ai sensi dell'organizzazione comune dei mercati del settore ortofrutta, deve aver stipulato una convenzione con un'organizzazione di consulenza per il servizio di assistenza tecnica.



Ogni responsabile aziendale deve partecipare annualmente almeno due ore per ettaro di superficie iscritta ai corsi di formazione professionale relativi alla produzione integrata. Coloro che gestiscono una superficie superiore a 10 ettari, devono frequentare annualmente almeno 20 ore di formazione specifica. La superficie di riferimento utilizzata per il controllo è quella maggiore tra la superficie netta e la superficie del fascicolo aziendale (superficie LAFIS). La partecipazione ai corsi deve essere registrata in una lista, che deve essere allegata al quaderno di campagna. Siccome la formazione professionale costituisce un prerequisito per il rilascio della certificazione, il succitato numero minimo di ore di formazione deve già essere raggiunto al controllo del raccogliitore aziendale prima della raccolta. Come periodo di riferimento vengono utilizzati gli ultimi dodici mesi precedenti il controllo.

Aree di compensazione ecologica e cura dei dintorni del frutteto

Il frutticoltore cura e protegge anche i dintorni del proprio frutteto secondo i principi della produzione integrata. Ad esempio cespugli, muri a secco, cumuli di sassi o scarpate sono spesso utilizzati come ricoveri per numerosi animali utili (uccelli, ricci, donnole e altri). Pertanto queste zone non devono essere bruciate o irrorate con prodotti antiparassitari (erbicidi e altro).

Le aree di compensazione ecologica devono incidere per almeno il 5% della intera superficie destinata alla frutticoltura.



Cure colturali ecologiche:

- Stagno con una superficie minima di 50 m²
- Albero d'alto fusto

Considerazioni per l'allestimento di un nuovo frutteto

Il frutticoltore, per fare **un nuovo impianto**, dovrebbe scegliere la varietà frutticola più idonea alle caratteristiche pedoclimatiche del suo appezzamento, onde ottenere un'elevata produzione di buona qualità con mezzi il più possibile naturali.



Cura colturale ecologica: Scelta di una varietà resistente alla ticchiolatura o all'oidio.

Il frutticoltore dovrebbe cercare di utilizzare piante sane, virus-esenti e provenienti da mutazioni selezionate. Per una prevenzione attiva del colpo di fuoco è opportuno impiegare possibilmente materiale vivaistico accompagnato dal passaporto ZP ERWIAM (*Erwinia amylovora*). Questa dicitura garantisce che gli astoni sono stati prodotti in una Zona Protetta per il colpo di fuoco batterico.



Per i nuovi impianti, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato". In assenza di tale materiale dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC. Per il materiale d'impianto utilizzato il contenuto del relativo Passaporto delle piante dev'essere conservato per tre anni nel raccoglitore aziendale. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 il Passaporto delle piante (inglese *Plant Passport*) dev'essere apposto sull'unità di vendita (singola pianta, mazzo, pedana ecc.). I vivai normalmente includono le informazioni relative al Passaporto nei documenti di vendita (documento di trasporto, fattura). In questo caso la conservazione di questi documenti per tre anni soddisfa l'obbligo della documentazione prevista dal Regolamento fitosanitario.

Fatta salva la normativa fitosanitaria vigente, l'autoproduzione del materiale di propagazione è ammessa solo nel caso in cui l'azienda utilizzi varietà iscritte o con richiesta d'iscrizione nel registro nazionale delle varietà di piante da frutto. Nel caso in cui viene impiegato materiale vivaistico di produzione propria, si deve rispettare gli standard minimi previsti dalle leggi in materia e si deve documentare la provenienza del materiale vivaistico di partenza.

Non è consentito l'utilizzo di materiale di moltiplicazione proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM).

Per frutteti nuovi è in generale da preferire il sistema d'impianto che consenta di ridurre al minimo l'impiego degli erbicidi e permetta un'efficace distribuzione dei fitofarmaci.

Le **distanze d'impianto** variano a seconda della varietà e dei portainnesti prescelti. Sono da evitare dunque potature drastiche oppure interventi chimici con ormoni, per mantenerle entro gli spazi previsti.

L'**altezza degli alberi** e la loro profondità devono essere tale che il legno a frutto e le mele siano sempre bene illuminati all'interno della chioma.



Cura colturale ecologica: Allestimento di un nuovo frutteto al sistema a fila singola.

Questo sistema d'impianto consente una migliore illuminazione dei frutti durante tutto il periodo vegetativo e tutta la vita dell'impianto. La fila singola richiede minor impiego di presidi sanitari (soprattutto meno erbicidi) rispetto ai sistemi con più file e facilita l'applicazione di alternative rispetto al trattamento chimico lungo i filari.

I lavori di sistemazione e preparazione del suolo all'impianto devono essere eseguiti con gli obiettivi di salvaguardare e migliorare la fertilità del suolo evitando fenomeni erosivi e di degrado e vanno definiti in funzione della tipologia del suolo, della giacitura, dei rischi di erosione e delle condizioni climatiche dell'area. Devono inoltre contribuire a mantenere la struttura, favorendo un'elevata biodiversità della microflora e della microfauna del suolo ed una riduzione dei fenomeni di compattamento, consentendo l'allontanamento delle acque meteoriche in eccesso.

Gli eventuali interventi di correzione e di fertilizzazione di fondo devono essere eseguiti nel rispetto dei principi stabiliti al capitolo della concimazione.



La disinfestazione chimica del terreno non è consentita nella frutticoltura integrata.

Concimazione

Scopo della concimazione nella produzione integrata è quello di ricostituire il fabbisogno di elementi nutritivi mediante il ciclo biologico naturale. L'analisi del terreno è fondamentale per un dosaggio adeguato delle somministrazioni di concimi a base di **fosforo, potassio, magnesio, boro** ed altri elementi nutritivi.



Intervallo e epoca di campionamento

Per ogni appezzamento (come risulta da estratto catastale) occorre allegare l'analisi del terreno che deve contenere almeno i seguenti parametri: tipo di terreno, contenuto di humus, pH, calce, fosforo, potassio. Un'analisi del terreno è valida **esattamente 5 anni dal giorno d'emissione del documento d'analisi.**

Eccezioni: Aziende con più appezzamenti che però siano dotati provatamente di una tessitura del terreno ed un grado di approvvigionamento nutritivo simile e di un'analoga gestione colturale, necessitano di una sola analisi del terreno proveniente da una superficie rappresentativa. Se invece gli appezzamenti differiscono per la loro struttura e/o per il contenuto in elementi nutritivi, allora è necessario provvedere a più analisi del terreno. Non ha alcun senso, agronomicamente valido, mescolare insieme terreno di appezzamenti differenti. Infatti in questo modo non sarebbe possibile definire un'idonea concimazione da apportare al terreno. Non è ammesso mettere insieme appezzamenti di proprietari diversi per il campionamento. Il campionamento deve essere fatto in un momento sufficientemente lontano dagli interventi di lavorazione e di fertilizzazione.

Le **analisi fogliari e dei frutti** sono utili per scoprire eventuali carenze, eccessi nutritivi oppure problemi inerenti la qualità interna.



Cura colturale ecologica: Esecuzione di un'analisi fogliare precoce.

Le analisi fogliari precoci che si fanno quando i germogli riducono la loro attività vegetativa, consentono d'accertare per tempo l'effettiva situazione nutritiva dell'albero. Squilibri nutrizionali si possono riequilibrare in breve tempo mediante adeguate concimazioni fogliari, mentre a lungo termine con la concimazione del terreno sarà regolata l'alimentazione dell'albero.

Il **concime va somministrato** in funzione degli elementi nutritivi già presenti nel terreno e del fabbisogno degli alberi. Il fabbisogno specifico di concime per un determinato terreno e relativa coltura può essere valutato soprattutto osservando la combinazione fra le analisi del terreno e quelle fogliari. Sono da evitare gli eccessi di concime nell'interesse della salute della pianta, della qualità dei frutti e della protezione dell'ambiente (falde freatiche).

La presenza di azoto assorbibile nel terreno viene determinato con l'analisi dell' N_{min} . Inoltre anche la lunghezza della vegetazione, il colore e la grandezza delle foglie, nonché dei frutti, forniscono indici importanti sull'attività dell'azoto. Un'eccessiva quantità di questo elemento nutritivo causa sulle mele un colore di fondo più scuro ed un sovraccalore più chiaro, mentre un eccesso di potassio aumenta il pericolo della comparsa di butteratura amara.



Cura colturale ecologica: Esecuzione della concimazione azotata in base a un'analisi dell' N_{min} .

Con il metodo dell' N_{min} si è in grado di determinare la quantità d'azoto minerale presente nel terreno (nitrato ed ammonio). In base al contenuto di humus ed al tipo di terreno si stimerà l'apporto di azoto proveniente dai filari e in base a questi valori si determinerà la concimazione azotata indispensabile.



L'applicazione di concimi (ad eccezione dei correttivi calcarei e calcarei-magneziaci e dei prodotti contenenti chelato di rame che promuovono la caduta delle foglie) è vietata nel periodo dal 1° dicembre a fine febbraio dell'anno successivo. L'utilizzo dei fertilizzanti è vietato anche su terreni gelati, innevati, saturi d'acqua o inondati. Verso i corsi d'acqua naturali e i canali di scolo artificiali deve essere rispettata una distanza minima di 5 m, verso i laghi naturali una distanza minima di 10 m.

Gli effluenti da allevamento (p.es. letami, liquami, liquiletami) non devono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano, perciò l'applicazione è consentita solamente nel periodo dopo la raccolta fino al 30 novembre e nel periodo dal 1° marzo fino alla fine della fioritura.

Tramite gli effluenti zootecnici annualmente possono essere apportati mediamente 127,8 kg di azoto per ettaro. Al fine di migliorare la struttura del suolo è consentito spargere fino a 50 metri cubi di letame per ettaro in fase di realizzazione di nuovi impianti e poi, a cadenza pluriennale, ulteriori 50 metri cubi di letame per ettaro in fase di produzione.

Asportazioni (valori indicativi)

Nella seguente tabella sono elencate le asportazioni annuali (kg/ha) dei principali elementi nutritivi da parte della coltura del melo per diverse produzioni:

Elemento nutritivo	Asportazione (kg/ha) con una produzione di		
	40 t/ha	60 t/ha	80 t/ha
Azoto (N)	16	24	32
Fosforo (P ₂ O ₅)	11	16	21
Potassio (K ₂ O)	57	85	113
Calcio (CaO)	3,2	4,8	6,5
Magnesio (MgO)	3,4	5,1	6,8
Boro (B)	0,112	0,18	0,24

Fonte: Centro Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg



Gli apporti di fertilizzanti saranno quantificati sulla base dei seguenti parametri:

Concimazione azotata

Apporto di Azoto	1. anno	2. anno	> 2. anno Produzione (t/ha)		
Azoto kg/ha	40	80	< 32 50	32-48 80	>48 110
Nel caso di apporto di ammendanti nell'anno in corso l'azoto viene calcolato al 30%.*					

* Per gli ammendanti (letame, compost) è importante tener conto dei processi di mineralizzazione a cui deve sottostare la sostanza organica. Esempio: Letame come ammendante ad attività prolungata distribuito in un ciclo pluriennale: Con un apporto di sostanze nutritive per ettaro pari a 127 kg di N, 84 kg di P₂O₅ e 121 kg di K₂O, nel primo anno si renderanno disponibili circa il 30% di questa quantità, cioè 38 kg di N, 25 kg di P₂O₅ e 36 kg di K₂O.

Quantitativo di azoto che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard in funzione delle diverse condizioni:

• In caso di scarsa dotazione di sostanza organica	+ 20 kg/ha
• In caso di scarsa attività vegetativa	+ 20 kg/ha
• In caso di surplus pluviometrico	+ 15 kg/ha

Quantitativo di azoto da sottrarre (-) dalla dose standard in funzione delle diverse condizioni:

• In caso di elevata dotazione di sostanza organica	- 20 kg/ha
• In caso di apporto di ammendanti nell'anno precedente	- 20 kg/ha

• In caso di eccessiva attività vegetativa	- 20 kg/ha
--	------------

In ogni caso l'apporto massimo ammesso d'azoto è di 140 kg/ha/anno.

Per ridurre al minimo le perdite per lisciviazione e massimizzare l'efficienza della concimazione occorre distribuire l'azoto nelle fasi di maggior necessità delle colture e frazionarlo in più distribuzioni se i quantitativi sono elevati. Il frazionamento delle dosi di azoto è obbligatorio quando il quantitativo da distribuire per singolo intervento supera i 60 kg/ha. Tra due applicazioni di azoto in questo caso deve esserci un intervallo minimo di tre settimane.

Concimazione fosfatica

Dotazione di Fosforo	1. anno	2. anno	> 2. anno Produzione (t/ha)		
			<32 t/ha	32-48 t/ha	>48 t/ha
A+B (dotazione scarsa del terreno)	15	40	45	55	65
C (dotazione normale del terreno)			30	40	50
D+E (dotazione elevata del terreno)			25	35	45

Quantitativo di P₂O₅ che potrà essere aggiunto (+) alla dose standard:

• In caso di scarsa dotazione di sostanza organica	+ 10 kg/ha
• per terreni con calcare attivo elevato	+ 20 kg/ha

Preimpianto e in fase di allevamento:

- Per le classi A+B senza arricchimento in preimpianto max. 65 kg/ha/anno per 5 anni consecutivi.
- In ogni caso, anche quando si facciano concimazioni di arricchimento e/o anticipazioni, non è consentito effettuare apporti nell'anno d'impianto superiori ai 250 kg/ha di P₂O₅.

Concimazione potassica

Dotazione di Potassio	1. anno	2. anno	> 2. anno Produzione (t/ha)		
			< 32 t/ha	32-48 t/ha	>48 t/ha
A+B (dotazione scarsa del terreno)	20	90	115	150	185
C (dotazione normale del terreno)			55	90	125
D+E (dotazione elevata del terreno)			15	50	85

Quantitativo di K₂O da sottrarre (-) dalla dose standard:

• In caso di apporto di ammendanti	- 30 kg/ha
------------------------------------	------------

Preimpianto e in fase di allevamento:

- Per le classi A+B senza arricchimento in preimpianto max. 185 kg/ha/anno per 5 anni consecutivi.
- In ogni caso, anche quando si facciano concimazioni di arricchimento e/o anticipazioni, non è consentito effettuare apporti nell'anno d'impianto superiori ai 300 kg/ha di K₂O.

Magnesio e Boro

Elementi nutritivi in kg/ha con produzione di 60 t/ha: necessità stabilite in base ad analisi del terreno.

Dotazione del terreno	MgO	Boro
A+B (dotazione scarsa del terreno)	30-50	0,7-1,4
C (dotazione normale del terreno)	20-30	0,5-0,7
D+E (dotazione elevata del terreno)	0-20	0-0,5

Fonte: laboratorio chimico del CS Laimburg (BZ)

Concimazione con calcio

Un'analisi del suolo costituisce la base per decidere se la concimazione con calcio è necessaria. Se ci fossero domande o ambiguità nell'interpretazione dei risultati delle analisi, il produttore dovrebbe consultare un tecnico. I concimi calcici elencati nell'appendice possono essere utilizzati per la concimazione.



La quantità di concime effettivamente distribuita è da riportare nel quaderno di campagna.

Non sono da consigliare trattamenti ripetuti con **concime fogliare** in un frutteto ben equilibrato, in quanto non portano vantaggi economici. Un eccesso nutritivo attraverso la foglia può provocare anche problemi di qualità nei frutti.



I seguenti concimi non possono essere impiegati nella produzione integrata:

- concimi che non rispondono né al Regolamento (UE) n. 2019/1009 né al Decreto Legislativo del 29 aprile 2010, n. 75.
- concimi che come materia prima contengono determinati rifiuti di origine animale (farina di carne, cernicchio, farina di pesce, farina di ossa, farina di sangue, sangue fluido, gelatina, epitelio animale, pelle o cuoiattoli).
- concimi che contengono più di 0,001 g/kg di perclorati.
- concimi fogliari e concimi per la fertirrigazione che superano i seguenti livelli massimi di amminoalcoli:
 - morfoline 0,01 g/kg,
 - dietanolammina 0,01g/kg,
 - trietanolammina 0,01 g/kg,
 - monoetanolammina 0,1 g/kg.

I concimi elencati nell'appendice possono essere impiegati nella produzione integrata. L'elenco aggiornato viene pubblicato sul sito dell'AGRIOS.

Non sono ammessi come fertilizzanti nella produzione integrata i fanghi di depurazione ed i composti da rifiuti, come pure concimi che contengano elementi tossici o elementi che inquinano il terreno, oppure presentino dubbi dal punto di vista igienico.

Tutte le attrezzature per la distribuzione dei fertilizzanti devono essere idonee al relativo impiego e devono essere tenute in buono stato. Ciò significa che, accanto ad una manutenzione regolare, occorre provvedere ad una revisione e messa a punto annuale, per essere sicuri che verranno distribuite le quantità di concime effettivamente desiderate. Questi lavori di manutenzione devono essere annotati in un piano di manutenzione, che deve essere allegato al quaderno di campagna.

Corroboranti potenziatori delle difese delle piante

I corroboranti potenziatori delle difese delle piante elencati nell'Allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 229771 del 22.05.2022 possono essere utilizzati.

La cura del filare e dell'interfilare

La striscia del terreno lungo il filare nei frutteti in produzione può essere lasciata **inerbita durante tutto l'anno** e sfalcata con l'interfilare.

Un inerbimento prima della raccolta riduce l'offerta di azoto e quindi consente una migliore qualità dei frutti e riduce contemporaneamente i residui di nitrati al termine del periodo vegetativo.

Per coprire il filare si addicono specialmente piante erbacee a taglia bassa, dotate di radici superficiali che non esercitano concorrenza con gli alberi.

È possibile anche la **copertura del filare** con composto di corteccia, perché lo mantiene umido e sopprime l'erba. Però tale sistema favorisce la comparsa di topi campagnoli.

La **lavorazione meccanica** del terreno lungo il filare è una soluzione rispettosa per l'ambiente.

Nei **frutteti in produzione vigorosi** non si dovrebbero impiegare erbicidi.



Cura colturale ecologica: Inerbimento della striscia lungo il filare tutto l'anno oppure rinuncia agli erbicidi. Fino a quando lo sviluppo dell'albero e l'apporto naturale dell'azoto sono sufficienti, i frutteti in produzione dovrebbero rimanere inerbiti tutto l'anno (corsia di percorrenza e striscia lungo il filare). Ciò consente all'azoto di rimanere vincolato e quindi si avrebbe un vantaggio soprattutto in frutteti vigorosi.



In frutteti a **fila singola** la **striscia investita** da diserbo chimico non dovrebbe superare i 70 cm e **al massimo** può essere il **30% della distanza tra le file**. Su file multiple è ammesso un trattamento sulla superficie coperta dagli alberi. La larghezza massima della striscia diserbata viene determinata dalla distanza tra le due file esterne più 35 cm su entrambi i lati, misurati sempre dal tronco.

Dal 26.11.2018 per tutte le barre per trattamenti erbicidi è prescritto dalla legge un controllo funzionale. Per una riduzione della deriva sulle superfici non bersaglio l'AGRIOS raccomanda di utilizzare soltanto barre dotate di schermatura e di montare i dispositivi di schermatura eventualmente ancora mancanti.

Nelle zone in cui i frutteti si coprono con reti, destinate alla difesa contro il maggiolino, è concesso l'uso degli erbicidi su tutta la superficie per impedire agli insetti un'alimentazione di maturazione sotto le reti stesse.

Il numero dei passaggi all'anno con la pacciamatrice per **la cura dell'interfilare** deve tenere conto della situazione del terreno e delle piante (vigorizia degli alberi, compattezza e contenuto idrico del terreno). Nel caso di alberi vigorosi su terreno bagnato e clima umido bastano 3-4 passaggi all'anno. Falcidiando meno frequentemente il tappeto erboso, si conservano più specie di piante.



Cura colturale ecologica: Esecuzione della pacciamatura su file alterne. Con questo metodo di pacciamatura e la riduzione della quantità d'azoto somministrata, si consente lo sviluppo a numerose specie di erbe a foglia larga e graminacee, che durante la loro fioritura costituiscono fonte d'alimentazione per numerosi insetti (sirfidi, braconidi ecc.).



Prima dei trattamenti con prodotti nocivi per le api, devono essere falciate le colture erbacee in fioritura.

Irrigazione

L'irrigazione serve a coprire il fabbisogno di acqua della coltivazione. In questo modo si vuole assicurare una sufficiente crescita della pianta e dei frutti come anche lo sviluppo delle loro qualità. Devono essere evitati sia l'eccesso che il difetto d'acqua.

Quantitativi eccessivi di acqua conducono a perdite d'acqua e dilavano elementi nutritivi oltre a poter favorire la formazione di organismi dannosi. Nella tarda estate ciò può anche ingenerare una scarsa maturazione del legno, la quale determina per le varietà sensibili, un aumento del rischio di danni da gelo durante l'inverno.

Infine l'eccessiva irrigazione durante l'estate può favorire le infestazioni da *Alternaria* e da ticchiolatura dovute alla lunga fase umida della foglia e alle perdite da dilavamento.

L'irrigazione dovrebbe quindi corrispondere al fabbisogno effettivo.



Cura colturale ecologica: Controllo dell'umidità del suolo mediante tensiometri o altri strumenti di misurazione.

L'irrigazione si orienta al deficit pluviale e alla capacità di ritenzione dell'acqua (capacità del campo) e alla profondità del terreno.

Si consiglia di adottare, quando tecnicamente realizzabile, la pratica della fertirrigazione al fine di migliorare l'efficienza dei fertilizzanti e dell'acqua distribuita e ridurre i fenomeni di lisciviazione.



Per ciascun appezzamento l'azienda deve registrare sul quaderno di campagna:

1) Data e volume di irrigazione:

- irrigazione soprachioma: data e volume di irrigazione utilizzato per ogni intervento; (il volume d'irrigazione sarà calcolato nei seguenti modi:
 - - attraverso la lettura del pluviometro,
 - - attraverso la lettura del contatore posizionato sull'accesso della condotta irrigua di ogni appezzamento,
 - - calcolando il volume irrigato per 1 ora di irrigazione).
- irrigazione a goccia e microjet: volume di irrigazione per l'intero ciclo colturale (o per intervalli inferiori) prevedendo l'indicazione delle sole date di inizio e fine irrigazione.

In caso di gestione consortile o collettiva dei volumi di adacquamento i dati sopra indicati possono essere forniti a cura della struttura che gestisce la risorsa idrica.

2) Dato di pioggia: ricavabile da pluviometro o da capannina meteorologica, oppure disporre di dati forniti da Servizi Meteo (sono esentati dalla registrazione di questo dato le aziende con superficie inferiore all'ettaro e quelle dotate di impianti di irrigazione a goccia e microjet).

3) Volume di adacquamento:

L'azienda deve rispettare per ciascun intervento irriguo il volume massimo di seguito riportato previsto in funzione del tipo di terreno secondo l'analisi del terreno:

Tipo di terreno	Classificazione	Irrigazione a goccia e microjet		Irrigazione soprachioma	
		mm	m ³ /ha	mm	m ³ /ha
Sabbia	leggero	15	150	35	350
Sabbioso debolmente franco					
Sabbioso limoso					
Sabbioso mediamente franco					
Sabbioso altamente franco					
Limoso sabbioso	medio impasto	20	200	45	450
Franco sabbioso					
Limoso argilloso					

Franco limoso	pesante	25	250	55	550
Franco argilloso					
Argilla					

Il tipo di terreno secondo l'analisi del terreno può essere riportato nel quaderno di campagna. Se vi non è specificato alcun tipo di terreno, dev'essere rispettata la quantità massima per i terreni leggeri.

Gli interventi per irrigazione antibrina non sono da calcolare come interventi irrigui e non soggiacciono ai limiti sopra elencati.

Occorre sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte da un impiego efficiente e senza perdite delle risorse idriche, per es. l'irrigazione durante le ore notturne, riparazioni delle perdite, ridurre le quantità d'acqua per ogni somministrazione, ecc. Dove è possibile si dovrebbe preferire l'irrigazione a goccia.



Cura colturale ecologica: Utilizzo dell'irrigazione a goccia.



Il ricorso all'irrigazione per scorrimento dovrebbe essere evitato per quanto possibile. Quando si mette a dimora un nuovo impianto, si deve passare ad un'altra forma di irrigazione. Il ricorso all'irrigazione per scorrimento è vietato per impianti frutticoli messi a dimora a partire dal 2021.

Qualità dell'acqua

Le risorse idriche disponibili per la frutticoltura, dal 1997 sono analizzate regolarmente, in Alto Adige, secondo un programma di controllo da parte dell'Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche della Provincia Autonoma di Bolzano. Questi controlli forniscono indicazioni sulla qualità dell'acqua. L'Ufficio su richiesta mette a disposizione la relativa documentazione.



In nessun caso si devono impiegare per l'irrigazione acque nere (fognatura).

Allevamento della pianta e qualità dei frutti

È auspicabile un **aumento annuale** della lunghezza dei rami da 20 a 30 cm. Qualora fossero più lunghi, consigliamo rimedi adatti al caso per ridurre la vigoria (cambiare la potatura invernale, ridurre la concimazione azotata, ridurre le irrigazioni, fare il taglio delle radici e l'inerbimento lungo il filare).

Attualmente, in frutticoltura, risulta essere una necessità economica ottenere raccolti costanti e di buona qualità. Perciò il frutticoltore, adottando le cure colturali rispettose per l'ambiente deve impegnarsi a migliorare la qualità dei frutti (gusto, rapporto zuccheri/acidi, qualità fisiologica, conservabilità e qualità igienica).

Per molte varietà di mele è indispensabile il **diradamento chimico dei frutticini** (la scelta dei prodotti è riportata nell'appendice). Una cura colturale particolarmente efficace è rappresentata dal diradamento manuale dei frutti danneggiati, in soprannumero, piccoli, rugginosi o deformati.



Per ridurre **la rugginosità dei frutti**, nella produzione integrata, sono ammessi soltanto prodotti come **Caolino, Gibberelline e Benziladenina**. Non è consentito l'utilizzo di prodotti sintetici, che hanno lo scopo di anticipare o ritardare la maturazione o intensificare la colorazione.



Cura colturale ecologica: Diradamento meccanico con la spazzolatrice.

La difesa integrata

a) Prevenzione

Tutto il programma di produzione è concepito in modo tale che gli alberi riescano a mantenere la loro **resistenza naturale** agli insetti dannosi ed alle crittogame; quindi si riesce a ridurre i trattamenti al minimo possibile.

Alberi molto vigorosi sono più sensibili alla ticchiolatura, all'oidio, agli afidi, agli acari ed ai ricamatori.

La difesa antiparassitaria integrata prevede anche di proteggere e di favorire gli **antagonisti naturali** dei parassiti dannosi agli alberi.

Per consentire la loro **presenza ed ambientazione naturale** consigliamo le seguenti cure:

- È opportuno piantare **siepi** (luogo ideale per la riproduzione degli uccelli) ai limiti del frutteto.
- È opportuno lasciare **muri a secco** (manufatti adatti a donnole, ricci, colubridi). Questo vale anche per mucchi di sassi, rami, tubi ed altri nascondigli.
- Allo scopo di attirare **uccelli rapaci** (poiana, falco, gufo, civetta) consigliamo di approntare stanghe per consentire loro di sostare nei frutteti.
- **Uccelli insettivori** (cinciallegre, cinciarella, torcicollo, pettirosso, passero ed upupa) durante il periodo della covata divorano numerose larve (falene, nottue, sesie e ricamatori). E' consigliabile predisporre nel frutteto nidi artificiali di più tipi (nidi dotati di un foro d'entrata di 32 mm e di 45-55 mm).
-
- I **fitoseidi** (con l'aiuto di coccinellidi e di antocoridi), se sono rispettati, riescono agevolmente a tenere sotto controllo gli acari fitofagi nel frutteto. Se non fosse presente un numero sufficiente di fitoseidi, consigliamo d'insediarli prelevandoli da altri frutteti.
- Vasi o cassette contenenti paglia o lana di legno rappresentano rifugi ideali di svernamento per le **crisope**.



Cure colturali ecologiche:

- Distribuzione di nidi per favorire l'insediamento delle cinciallegre.
- Approntamento di stanghe per la sosta di uccelli rapaci.
- Creazione di nascondigli per il riccio, topo ragno, serpenti e donnole.
- Apporto di fitoseidi nei frutteti.

b) Metodi alternativi di difesa antiparassitaria

La difesa integrata prevede di favorire l'adozione di **mezzi e cure alternative** (non chimici).

- I **rami colpiti dall'oidio e dagli afidi dovrebbero essere asportati**. Con ciò si riduce la pressione infettiva e si migliora la difesa.
- Il **metodo della confusione sessuale** dovrebbe essere applicato dove sono presenti la carpocapsa, la cidia del pesco, i ricamatori e il rodilegno giallo. Se il grado d'infestazione è basso si ottiene una riduzione della popolazione e così si evitano i problemi causati da un suo successivo incremento. Questo metodo biotecnologico consente di evitare trattamenti o quantomeno evitare sprechi, oltre ad evitare o perlomeno posticipare la comparsa di resistenza nei confronti dei prodotti consigliati. Se possibile, gli erogatori utilizzati dovrebbero essere biodegradabili.
- Le **trappole alcoliche** (8 trappole/ettaro) sono il metodo di difesa più efficace per il bostrico (*Anisandrus*).

- Per la difesa contro sesia del melo sono adatte trappole con liquido attrattivo. Mediante gli insetticidi si può colpire in maniera abbastanza soddisfacente soltanto le giovani larve di sesia. Inoltre la difesa su alberi più anziani è tecnicamente difficile da fare. Con trappole dotate di liquido attrattivo è possibile catturare una buona parte delle farfalle.
- La **riproduzione e la distribuzione in massa di insetti utili** (Prospaltella, fitoseidi, Trichogramma ed altri) rappresentano un sistema molto efficace, spesso migliore dei prodotti chimici.
- Le piante di melo che manifestano chiari sintomi di scopazzi devono essere estirpate.



Cure colturali ecologiche:

- Applicazione del metodo della confusione sessuale contro carpocapsa, cidia del pesco, ricamatori e rodilegno giallo.
- Approntamento di trappole con liquido attrattivo contro la sesia del melo.
- Approntamento di trappole per la cattura massale delle carrughe degli orti.
- Approntamento di trappole per la cattura massale delle mosche della frutta.
- Asporto dei rami colpiti dall'oidio o dagli afidi.
- Utilizzo delle apposite reti nelle zone colpite dal maggiolino.

c) Strategia anti-resistenza

Le resistenze di organismi nocivi possono rendere molto difficile la tutela delle piante e conseguentemente provocare seri problemi nella regolazione della loro popolazione. Pertanto si devono adottare tutte le possibili precauzioni per contrastare la formazione di resistenze. L'obiettivo della produzione integrata consiste nell'utilizzo integrante di tutti i metodi non chimici nella difesa delle piante. La produzione integrata è di per sé adatta, nel caso dell'applicazione costante delle sue regole, a prevenire resistenze di organismi nocivi o quantomeno a ritardarne la comparsa.

Le regole fondamentali per una strategia anti-resistenza mirata e vincente vengono riportate qui di seguito:

- **Ridurre le applicazioni di fitofarmaci:** Ogni applicazione non eseguita ritarda la resistenza. Se l'applicazione fosse comunque necessaria (osservare le soglie di danno!), bisogna scegliere accuratamente i principi attivi impiegandoli in modo finalizzato. Per far ciò occorre un'approfondita conoscenza della biologia e della comparsa del parassita. La scelta corretta dei prodotti e del momento più adatto per l'applicazione, la dose, nonché una perfetta distribuzione, comportano un ottimo risultato del trattamento e spesso un risparmio di applicazioni. Un intervento con insetticidi è da limitare possibilmente solo sui focolai.
- **Evitare una copertura continua:** La copertura della miscela antiparassitaria dovrebbe rimanere nell'ambiente (sugli alberi) solo per il tempo strettamente necessario. Anche principi attivi poco persistenti, se dovessero essere utilizzati a brevi intervalli, producono pure una copertura continua. Prodotti persistenti devono essere impiegati con parsimonia e nel momento più adatto possibile. Per questo motivo l'impiego di alcuni principi attivi è ammesso solo in modo limitato.
- **Impiego di mezzi e cure alternative:** È uno dei principi della difesa integrata. Tra questi ci sono per esempio il metodo della confusione, il *Bacillus thuringiensis*, le reti anti-maggiolino, gli antagonisti (fitoseidi) ecc.
- **Proteggere e favorire gli insetti utili:** A loro spetta un ruolo importante nella strategia anti-resistenza. La loro azione regolatrice su parassiti aiuta a risparmiare trattamenti chimici. Indipendentemente dal grado o dal meccanismo di resistenza dei parassiti, gli insetti utili sterminano quelli nocivi ed impediscono così una selezione di popolazioni resistenti.
- **Alternare i diversi principi attivi:** Un impiego alternato e ragionato dei principi attivi può ritardare per un lungo periodo la formazione di resistenza. Risulta però fondamentale, sostituire veramente il meccanismo d'azione dei principi attivi impiegati, cioè il modo con cui essi eliminano i parassiti. I principi

attivi impiegati dovrebbero appartenere pertanto a diversi gruppi. Nel rispetto del programma sarà data la possibilità di optare per diverse soluzioni.

Una strategia anti-resistenza deve iniziare prima che i mezzi adottati perdono la loro efficacia. Secondo le esperienze alcuni principi attivi sono particolarmente predestinati ad indurre più facilmente la formazione di resistenza. L'impiego di queste sostanze deve avvenire in modo restrittivo (vedi liste dei principi attivi nell'appendice).

Proprio l'impiego di acaricidi, se si rispettano i fitoseidi, non dovrebbe entrare nel programma di produzione integrata. L'impiego limitato di questi prodotti può garantire una buona efficacia nei casi in cui per diversi motivi fosse necessario un trattamento con acaricidi.

Una **strategia anti-resistenza ponderata e conseguente** concorda con la produzione integrata ed è il presupposto per la sua applicazione a lungo termine.

d) La scelta dei prodotti

La difesa integrata cerca di assicurare il successo economico dell'azienda frutticola impiegando il meno possibile prodotti chimici e fra loro quelli più rispettosi per l'ambiente.

I prodotti chimici nella difesa antiparassitaria integrata devono essere utilizzati solamente quando è necessario.



Pertanto nei frutteti ai momenti di monitoraggio più importanti, deve essere controllata la presenza di malattie e di insetti sia dannosi che utili. Annualmente devono essere eseguiti almeno due controlli sulla presenza di insetti utili per un totale di almeno quattro ore per ettaro. A fine maggio/inizio giugno nei frutteti si deve controllare la presenza di macchie da un'infezione primaria di ticchiolatura (100 rametti per frutteto). Per ogni ettaro di superficie iscritta annualmente devono essere eseguite in campagna almeno otto ore di controlli. La superficie di riferimento utilizzata per il controllo è quella maggiore tra la superficie netta e la superficie del fascicolo aziendale (superficie LAFIS). I controlli e i risultati dei rilievi devono essere annotati nel quaderno di campagna. Siccome il succitato numero minimo di rilievi costituisce un prerequisito per il rilascio della certificazione, deve già essere raggiunto al controllo del raccogliatore aziendale prima della raccolta.

Fra i prodotti antiparassitari, ammessi dalla legge, sono da scegliere quelli che:

- sono meno pericolosi per **l'operatore e per chi lavora nel frutteto**,
- riescono a mantenere l'insetto dannoso al di sotto della **soglia di tolleranza** e non danneggiano insetti utili ed altri organismi,
- sono **meno dannosi per l'ambiente** (terreno, acqua ed aria) e quelli che
- provocano **meno residui** sulla frutta e nell'ambiente.

Prodotti fitosanitari con classificazioni di pericolo per la salute dell'operatore di grado inferiore sono da preferire quando della stessa sostanza attiva esistono anche formulazioni con frasi H particolarmente critiche.

La necessità di un **trattamento acaricida** rappresenta il segnale che nel frutteto è stato alterato l'equilibrio biologico naturale fra il fitofago ed i suoi antagonisti. In questo caso è da limitare l'applicazione di fitofarmaci dannosi agli insetti utili per proteggere e favorire particolarmente i fitoseidi ed altri nemici degli acari.

Nei frutteti dove s'impiegano prodotti selettivi vi è maggiore possibilità di sopravvivenza per gli insetti utili.



Nel programma AGRIOS 2026 sono ammessi solamente quei principi attivi (con le relative limitazioni), che risultano inseriti nelle linee guida nazionali 2026 e nella lista dei principi attivi per la produzione frutticola integrata 2026.

Tutti i principi attivi vi non citati non sono ammessi nel programma AGRIOS 2026, a meno che essi non vengano eventualmente riammessi durante l'anno. Un impiego di principi attivi non ammessi, oppure

la loro presenza nelle analisi dei residui porta al non rilascio rispettivamente al ritiro della certificazione per i relativi appezzamenti, ovvero per l'intera azienda agricola. Il non rilascio rispettivamente il ritiro della certificazione per l'appezzamento evidentemente avviene anche nei casi in cui venissero impiegati prodotti per la difesa delle colture, che in Italia non risultassero registrati per la coltura in esame.

Sostanze di base, sostanze a basso rischio, microrganismi e feromoni

Possono essere utilizzate tutte le sostanze di base approvate ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del 21.10.2009.

Inoltre, possono essere utilizzate tutte le sostanze attive a basso rischio, tutti i microrganismi e tutti i feromoni a condizione che siano contenute in prodotti regolarmente autorizzati in Italia e solo nel caso in cui le avversità bersaglio siano presenti nelle relative schede di coltura. Tali sostanze possono essere utilizzate anche nel caso in cui non siano esplicitate nelle schede di coltura.

Le sostanze attive di cui sopra sono escluse dal numero massimo di interventi previsti per le singole avversità nelle singole schede di coltura.

Bagnanti

L'impiego di bagnanti nella produzione integrata di pomacee è ammesso nel rispetto delle indicazioni di etichetta.

Smaltimento scorte

È autorizzato l'impiego delle scorte di magazzino dei prodotti fitosanitari ammessi nel programma di produzione integrata dell'anno scorso. Tale deroga deve intendersi valida esclusivamente per l'esaurimento delle scorte presenti e registrate regolarmente nelle schede di magazzino alla data dell'entrata in vigore delle nuove norme. Tale autorizzazione non può intendersi attuabile qualora siano venute meno le autorizzazioni all'impiego o qualora non sia stato stabilito un periodo per il consumo delle scorte.

Vincoli da etichetta

Le indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti fitosanitari devono sempre essere ottemperate.

Varietà impollinatrici

Quando in un frutteto sono presenti singoli alberi come varietà impollinatrice e gli interventi fitosanitari devono essere eseguiti insieme con la varietà principale, per questi valgono le stesse limitazioni come per la varietà principale.



Cura colturale ecologica: Distribuzione di trappole a feromoni e regolari rilievi delle catture.

Le trappole a feromoni offrono la possibilità di seguire il volo delle farfalle dannose più importanti (ad es. carpocapsa, cidia del pesco e ricamatori). Una corretta interpretazione di questi dati (picco e durata del volo, andamento climatico, ovideposizione) sono utili per decidere l'esecuzione di un intervento.

Poiché diverse trappole catturano gli insetti in numero differente, in caso di difficoltà interpretative, il frutticoltore deve rivolgersi all'esperto.

e) La quantità di prodotti antiparassitari per ettaro e anno

La quantità di prodotti antiparassitari per ettaro ed anno è in funzione di tre fattori:

- **Dose:** In linea di massima nell'impiego dei prodotti antiparassitari si sceglie sempre la dose più bassa, sufficiente per mantenere un'infestazione al di sotto della soglia economica di danno. Non è nello spirito della difesa integrata l'efficacia del 100 % contro un insetto dannoso. Ciò è troppo costoso, favorisce la comparsa di ceppi resistenti ed inquina l'ambiente più del necessario.
- La **quantità di miscela ad ettaro** varia a seconda del sistema d'impianto, delle dimensioni degli alberi e della concentrazione della miscela. Lavorando con concentrazione normale la quantità della miscela per file singole non dovrebbe superare 500 l/ha/m d'altezza delle piante. Utilizzando concentrazioni superiori si ridurrà proporzionalmente il quantitativo/ha.

- Il **numero dei trattamenti all'anno** dipende dalla presenza dei fitofagi (soglia di tolleranza), dall'andamento climatico (ad es. per la ticchiolatura) e dalla prevedibile perdita di produzione (soglia economica di danno).

Informazioni sui limiti da rispettare nei trattamenti contro i diversi parassiti sono contenute nella Guida per la "Difesa fitosanitaria integrata" edite dal Centro di Consulenza per la frutticoltura dell'Alto Adige.



L'applicazione di un prodotto fitosanitario contro carpocapsa, ricamatori e cidia del pesco deve avvenire solo al raggiungimento delle soglie di danno elencate nell'appendice. Il superamento della soglia di danno dev'essere documentato nel quaderno di campagna registrando i risultati dei rilievi eseguiti.

Stoccaggio e distribuzione dei prodotti antiparassitari

Prodotti antiparassitari: custodia adeguata, distribuzione e smaltimento



Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere costituito da un apposito locale o da un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da un apposito armadio. L'accesso al deposito è consentito unicamente agli utilizzatori professionali. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo e i numeri di emergenza. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente. Il locale deve disporre di sistemi di contenimento in modo che sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria. Il magazzino deve garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali. Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti. Scaffali in legno possono essere trattati con una vernice protettiva resistente all'acqua.

I prodotti fitosanitari, erbicidi compresi, devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili. Le formulazioni solide devono essere conservate in alto, sopra le confezioni dei prodotti liquidi. Fertilizzanti utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari (es. concimi fogliari) possono essere conservati nel deposito dei prodotti fitosanitari. I concimi per il terreno invece devono essere conservati separati dai prodotti fitosanitari.

Temporaneamente nel deposito dei fitofarmaci possono essere conservati anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito. Nel deposito non possono essere immagazzinate sostanze alimentari e mangimi.

Prima dell'inizio della nuova stagione antiparassitaria occorre stilare una lista dei prodotti per la difesa delle piante ancora in giacenza, che deve essere allegata al quaderno di campagna.

Durante la preparazione della miscela occorre sempre portare adeguati indumenti protettivi.

Se la quantità di miscela necessaria viene ben calcolata e se l'atomizzatore è calibrato in modo esatto, non si dovrebbero avere resti inutilizzati di miscela. Qualora nonostante tutto dovessero rimanere quantità residue nell'atomizzatore, esse si devono diluire e spruzzare nel campo appena trattato insieme con l'acqua necessaria per la pulizia della macchina.

Il frutticoltore è inoltre obbligato a smaltire le confezioni vuote e residui dei prodotti antiparassitari come previsto dalle disposizioni provinciali in materia.

Pulizia degli atomizzatori

La pulizia degli atomizzatori deve essere effettuata presso un impianto di lavaggio certificato con raccolta e smaltimento a regola d'arte dell'acqua di lavaggio prodotta oppure direttamente in un frutteto trattato. Se la pulizia viene effettuata sul campo, non deve essere ripetuta nello stesso punto o in aree di tutela dell'acqua

potabile. Per ulteriori informazioni si rimanda alla guida "Pulizia degli atomizzatori in agricoltura" dell'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi.

Tecnica di applicazione

Prima d'impiegare un nuovo atomizzatore si deve accertare la sua adeguatezza ai frutteti dell'azienda (sistema d'impianto, altezza degli alberi). Infatti una tecnica d'irrorazione rispettosa per l'ambiente è una prerogativa inderogabile per la produzione integrata.

Gli atomizzatori a flusso trasversale o con dispositivo di recupero della miscela (atomizzatori a tunnel) favoriscono minor deriva di prodotti antiparassitari nell'ambiente.

Per evitare che la deriva raggiunga il suolo e l'aria, è importante che gli ugelli siano ben orientati verso la parete fogliare dei fruttiferi. Gli ugelli che irrorano sopra o sotto la chioma sono da chiudere prima d'iniziare il trattamento.



Per evitare effetti deriva sulle superfici confinanti è necessario adeguare l'atomizzatore alle caratteristiche degli impianti per quanto riguarda il volume e la velocità di uscita dell'aria. A tale scopo, ad esempio, si può utilizzare carta sensibile all'acqua. Queste regolazioni devono essere effettuate nei frutteti in produzione almeno una volta all'anno in postfioritura. I lavori di regolazione eseguiti sono da registrare, la relativa documentazione deve essere allegata al quaderno di campagna.

Con l'impiego di ugelli ad iniezione d'aria a getto piatto si è in grado di ottenere una notevole riduzione della deriva.



Gli atomizzatori devono essere mantenuti in buono stato, curati e calibrati annualmente, in modo da garantire una distribuzione precisa delle quantità di miscela desiderate. I lavori di manutenzione eseguiti (messa a punto, riparazioni, cambio dei pezzi usurati) sono da annotare in un piano di manutenzione, che deve essere allegato al quaderno di campagna.

Tutte le aziende frutticole sono obbligate a far eseguire periodicamente un controllo funzionale da un centro di prova autorizzato per tutti gli atomizzatori utilizzati. I controlli funzionali sono validi per tre anni. Un'eccezione è prevista per gli atomizzatori nuovi, per i quali si applica un intervallo di controllo di cinque anni.

Per la partecipazione al programma AGRIOS deve essere impiegato un atomizzatore adatto per trattamenti a deriva ridotta dotato almeno delle seguenti attrezzature:

- un convogliatore a torretta;
- ciascuno dei portaugelli deve essere munito di ugelli a getto piatto ad iniezione d'aria con un angolo di spruzzo tra 80° e 90° **su tutte le posizioni dei getti**;
- un sistema di filtraggio a risciacquo automatico o manuale, un filtro deve avere maglie da almeno 80 mesh.

Se un responsabile aziendale gestisce impianti ad aiuole ossia a file multiple con almeno quattro file ovvero alberi tra gli interfilari con una superficie totale minima di 2.000 m², vale la seguente deroga:

- almeno le tre posizioni più alte dei getti devono essere dotate esclusivamente di ugelli a getto piatto ad iniezione d'aria con un angolo di spruzzo tra 80° e 90°;
- se con l'atomizzatore vengono trattati esclusivamente gli impianti ad aiuole ossia a file multiple sopra menzionati, sulle posizioni sottostanti si possono utilizzare ugelli a cono cavo con un'apertura massima corrispondente al colore ISO giallo -02;
- se con l'atomizzatore vengono trattati sia gli impianti ad aiuole ossia a file multiple sopra menzionati che anche gli altri frutteti dell'azienda (ad es. impianti a fila singola) sulle posizioni sottostanti è ammessa al massimo una serie di ugelli a cono cavo con un'apertura massima corrispondente al colore ISO giallo -02. Tutte le altre serie devono essere completamente attrezzate con ugelli a getto piatto ad iniezione d'aria con un angolo di spruzzo tra 80° e 90°. Gli ugelli a cono cavo possono essere utilizzati esclusivamente negli impianti ad aiuole ossia a file multiple.

Se l'atomizzatore viene usato anche per trattare gli impianti di ciliegio, si può montare una serie di ugelli a cono cavo dal momento della chiusura totale della rete antinsetto e del telo antipioggia. Gli ugelli a cono cavo possono essere utilizzati esclusivamente negli impianti di ciliegio.

L'atomizzatore utilizzato dev'essere in proprietà

- del produttore stesso,
- del responsabile aziendale,
- di un altro produttore, la cui azienda viene gestita dallo stesso responsabile aziendale come quella del dichiarante,
- di un familiare/apparentato (massimo 2° grado) del responsabile aziendale,
- di un terzo (documentata con fattura/contratto e a titolo oneroso - "Maschinenring", locatore leasing).

Se l'utilizzo di un atomizzatore per ragioni comprensibili (p.es. per la morfologia del frutteto) non fosse possibile, per la distribuzione dei prodotti fitosanitari è ammesso l'impiego di una lancia a mano.

Periodo di sicurezza dei trattamenti dal raccolto

Nell'appendice sono riportati i periodi di sicurezza previsti per la difesa integrata ovvero il tempo che deve intercorrere fra l'ultimo trattamento e l'inizio della raccolta. Questo periodo di sicurezza garantisce che le promesse fatte in merito ai residui di fitofarmaci vengono rispettate. Di solito si tratta del periodo di carenza previsto dalla legge dei diversi prodotti.

Il primo momento possibile per la raccolta si calcola mediante questa formula:

Data del trattamento + tempo di carenza in giorni + 1 giorno = primo giorno possibile per la raccolta

Residui di prodotti fitosanitari



Eventuali residui di principi attivi di prodotti fitosanitari ammessi nel programma sulla frutta proveniente da produzione integrata non devono superare il 50% delle quantità massime ammesse dalla legge. Ciò non vale per i loro prodotti di degradazione, per i quali deve essere rispettato il livello massimo di residuo consentito dalla legge. Se per un principio attivo il livello massimo di residuo ammesso è fissato al limite inferiore di determinazione analitica, questo valore è sufficiente anche per la frutta AGRIOS.

Protezione delle acque



Nel momento in cui si riempie la botte dell'atomizzatore e si prepara la miscela destinata ai trattamenti occorre prestare molta attenzione, affinché il liquido non sia versato in nessun caso sul terreno e/o raggiunga corsi d'acqua.

Anche durante la fase di distribuzione delle miscele fitosanitarie è inoltre necessario fare in modo che esse non arrivino a cadere entro corsi d'acqua. Già al momento in cui si pianificano i nuovi impianti è pertanto indispensabile tenerli ad una sufficiente distanza da fossati e da corsi d'acqua. Nella distribuzione di specifici prodotti fitosanitari è inoltre indispensabile prestare attenzione anche alle distanze minime indicate sulle etichette in apposite istruzioni per il rispetto dei corsi d'acqua.

Attenzione alla deriva

Dove coesistono varietà di mele con epoche di raccolta differenti e confinanti fra loro, sussiste il pericolo di deriva della miscela antiparassitaria durante il trattamento, causando così un **aumento di residui sulla frutta**, specialmente se i trattamenti vengono fatti poco prima della raccolta.

Per ridurre la deriva sulle varietà precoci al minimo possibile, l'ultima fila, a partire da metà giugno, dovrebbe essere trattata solamente verso l'interno, oppure nell'ultimo interfilare dovrebbe essere spenta la ventola dell'atomizzatore.



È obbligatorio evitare l'inquinamento di **corsi d'acqua** o dei **biotopi** con prodotti antiparassitari.

Misure per ridurre la deriva su altre colture

Si rimanda alle disposizioni di legge in materia.



Cura colturale ecologica: La messa a dimora di una siepe per ridurre la deriva sugli appezzamenti confinanti.

Misure per ridurre la deriva su superfici frutticole coltivate secondo i canoni dell'agricoltura biologica

Si rimanda all' „Accordo quadro per una coesistenza pacifica tra superfici frutticole coltivate secondo i canoni dell'agricoltura biologica e secondo le modalità dell'agricoltura integrata“.

Lotta contro i roditori



Per la lotta contro i roditori (topi) attualmente è ammesso solamente il principio attivo elencato nell'appendice. Per evitare rischi per persone, uccelli, animali domestici e selvatici, le esche devono essere collocate direttamente nelle tane dei topi. Le aree trattate devono essere segnalate con appositi cartelli di pericolo.

Protezione delle api

L'ape mellifera occidentale (*Apis mellifera*) è uno dei più importanti insetti impollinatori della frutticoltura. L'impollinazione dei fiori avviene quando l'ape raccoglie il polline e il nettare dai fiori per la sua alimentazione. Durante quest'operazione i pollini aderiscono alla peluria delle zampe dell'ape e vengono così trasferiti allo stigma del fiore visitato successivamente. L'attività di impollinazione delle api non solo assicura la rendita agraria e aumenta la qualità dei frutti, ma è anche garante della biodiversità. Per questo l'ape mellifera deve essere protetta.

Anche l'irrorazione con sostanze fitosanitarie può costituire un pericolo per l'ape mellifera. Se però gli agricoltori conoscono i modelli di comportamento delle api possono risultarne alcune possibilità di migliorare sensibilmente la protezione delle api durante la diffusione di sostanze fitosanitarie.

Misure di protezione



- L'Ufficio Frutti-Viticultura definisce annualmente un periodo (migrazione delle api) durante il quale l'irrorazione con sostanze fitosanitarie dannose alle api è proibita. Tale divieto deve essere assolutamente rispettato.
- Al di fuori del periodo di migrazione delle api la nebbia di sostanze dannose per le api emessa non deve assolutamente giungere su piante in fiore. Occorre fare particolare attenzione a piante a fioritura precoce (per esempio: il nocciolo o l'ontano), di cui le api hanno urgente bisogno per la loro nidata durante l'incipiente primavera.
- Tramite l'applicazione corretta della tecnica di irrorazione a deriva ridotta è possibile prevenire il deposito di sostanze fitosanitarie su piante in fiore.
- Al di fuori del periodo di migrazione delle api i prodotti pericolosi per le api dovrebbero essere irrorati, per quanto possibile, nelle ore serali dopo il volo diurno delle api, nella notte o nelle prime ore del mattino. Una volta che la miscela fitosanitaria si è asciugata il pericolo di avvelenamento delle api è notevolmente minore. A ciò occorre fare particolare attenzione anche nel periodo dopo la fine della fioritura dei meli. Le api continuano a volare nei frutteti e cercano il cibo sulle erbe fiorenti sotto le piante. Ciò accade soprattutto quando le api non trovano piante mellifere attraenti all'esterno dei meleti. Quasi tutti gli anni dobbiamo constatare che tra la fine della fioritura dei meli e l'inizio della fioritura dei



boschi passa un considerevole lasso di tempo. Proprio durante tale periodo le api ritornano nei frutteti alla ricerca di polline.

- Prima di effettuare un trattamento con sostanze pericolose per le api occorre falciare le erbe fiorenti sotto le piante. Anche questa operazione dovrebbe essere svolta fuori dal volo delle api, dato che molte api sostano anche sui fiori delle piante sottostanti.
- Durante la fioritura anche gli insetticidi non pericolosi per le api dovrebbero essere applicati fuori dal volo delle api. Inoltre si raccomanda di non miscelare insetticidi durante la fioritura con altri prodotti oppure, qualora ciò non sia possibile, di distribuirli in miscela con al massimo un altro prodotto antiparassitario.



Non si devono fare trattamenti con prodotti pericolosi per le api dal momento in cui s'osservano i primi fiori aperti e fino al momento in cui nei propri appezzamenti tutte le piante non risultino completamente sfiorite. Sono vincolanti le date d'inizio e di fine della fioritura annotate nel quaderno di campagna. L'impiego d'un prodotto pericoloso per le api su piante da frutto in fioritura dopo la dichiarata data d'inizio della stessa o prima della dichiarata data di fine fioritura viene sanzionato come i trattamenti eseguiti durante il periodo di proibizione fissato dall'Ufficio succitato.

Fitofarmaci dannosi per le api:

Le sostanze attive classificate dannose alle api sono quelle pubblicate annualmente dall'Ufficio Frutticoltura prima della fioritura. Questo decreto dev'essere rispettato tassativamente. Di seguito un elenco preliminare dei principi attivi classificati dannosi alle api ammessi nel programma AGRIOS:

Chlorantraniliprole	Etofenprox	Milbemectina
Deltametrina	Flonicamid	Pyridaben
Enamectina benzoato	Flupyradifurone	Spinosad

FRUTTA DA PRODUZIONE INTEGRATA NEI CENTRI DI CONDIZIONAMENTO/COMMERCIALIZZAZIONE

Consegna ai centri di condizionamento/commercializzazione

I parametri per la raccolta e la consegna della frutta vengono stabiliti dalle aziende commerciali competenti e hanno come scopo la raccolta dei frutti nella fase di maturazione ottimale per il mantenimento della qualità del prodotto durante lo stoccaggio.

Le partite di frutta da produzione integrata all'arrivo presso il magazzino devono essere contrassegnate chiaramente tramite indicazione sulla bolla di accompagnamento e sull'etichetta di ogni cassettoni.

Un apposito sistema contabile e di codificazione delle varietà permette di registrare dettagliatamente le singole partite (giorno di consegna, numero della bolla di accompagnamento, varietà, quantità dei cassettoni e/o delle cassette, peso netto, appezzamento ecc.). Questo permette di avere un quadro completo e dettagliato degli stock di frutta proveniente da coltivazione integrata e di frutta da coltivazione non integrata.

Alla consegna in magazzino occorre tenere a disposizione un elenco di tutti i produttori e appezzamenti iscritti, nonché delle varietà, nel quale risulti anche la certificazione non rilasciata o ritirata o l'eventuale disdetta. In tal modo si può evitare che, frutta non prodotta secondo le direttive, possa essere per sbaglio immagazzinata come merce AGRIOS.

I controllori possono inoltre prelevare, in ogni momento, dei campioni di frutta per accertare l'eventuale presenza di residui chimici o di altre sostanze estranee.

Il trattamento e la conservazione della frutta nel magazzino

Nel magazzino possono verificarsi diverse malattie. Le cause sono in parte di natura fisiologica (il riscaldamento, l'imbrunimento interno, butteratura amara, macchie lenticellari, ecc.) in parte possono essere dovute a diversi funghi che provocano la perdita di grosse quantità di frutta infetta.

a) Le malattie crittogamiche

Le malattie crittogamiche (ticchiolatura da magazzino, Gloeosporium, Monilia, Penicillina, Phytophthora ed altre) di solito sono facilmente evitabili in pieno campo. In questo senso è necessario eseguire nel momento più indicato e con grande cura i trattamenti primaverili, per evitare un'infezione primaria (ticchiolatura). Di primaria importanza in questo contesto è il trattamento finale nei campi che è da eseguire a seconda del tempo meteorologico, della posizione e della varietà con i prodotti più indicati. In questo modo è possibile prevenire per la maggior parte delle infezioni tardive.

Suggerimenti per l'igiene:

- Impiegate per la raccolta cassoni puliti.
- Evitate se possibile di sporcare i cassoni con terra, in quanto essi potrebbero essere possibili punti d'infezione.
- Pulite minuziosamente le celle di conservazione, i canali di selezione e le linee di confezionamento.

 È vietato l'impiego di fungicidi in post-raccolta.

b) Il riscaldamento

Per varietà suscettibili questo disturbo fisiologico può comparire anche dopo un periodo di conservazione piuttosto breve. Come metodo per impedire la comparsa del riscaldamento su tante varietà di mele nel programma AGRIOS sono consentiti trattamenti con 1-MCP (Methylcyclopropene).

Selezione e confezionamento

La manipolazione della frutta proveniente da produzione integrata deve essere tale da escludere scambi con frutta proveniente da produzione Non-AGRIOS.

La frutta da produzione integrata durante lo svuotamento, la calibratura, la selezione ed il confezionamento non deve sporcarsi o venire a contatto con sostanze estranee.

 Nella selezione si deve procedere in modo da rendere evidente se si sta lavorando con merce AGRIOS oppure con altri frutti. Ciò dev'essere controllabile anche in seguito. Le partite AGRIOS e quelle non AGRIOS non devono assolutamente essere mescolate. Proprio nella preselezione e nel corso dell'immagazzinamento provvisorio la merce dev'essere contrassegnata in modo da non poter essere cambiata in un secondo momento. Nello stesso modo anche durante l'imballaggio dev'essere chiaro se si tratta di frutti provenienti da frutticoltori aderenti al programma AGRIOS oppure no.

La frutta da produzione integrata deve essere confezionata ed offerta in imballaggi igienicamente sicuri, omologati per prodotti alimentari e rispettosi dell'ambiente.

Designazione e presentazione della frutta da produzione integrata

La frutta altoatesina che è stata prodotta e conservata secondo le direttive AGRIOS ed ha superato tutti i controlli, può fregiarsi della dicitura **"da produzione integrata"**.

Con questo marchio i frutticoltori, i responsabili della loro azienda commerciale e l'Organismo di Certificazione garantiscono che tale frutta, secondo i controlli e le analisi, è stata prodotta e conservata conforme alle direttive previste.

La **responsabilità** nei confronti del consumatore, dell'acquirente e delle autorità sanitarie, per garantire la "qualità igienica", ricade sull'azienda commerciale e sul produttore.



La frutta altoatesina che non è stata prodotta **provatamente** secondo queste direttive e non riconosciuta dall'Organismo di Certificazione, non può utilizzare l'indicazione "da produzione integrata" o diciture simili. Frutta dell'Alto Adige che viene usata per marchi con il chiaro presupposto della produzione integrata deve essere provatamente conforme alle direttive AGRIOS.

APPLICAZIONE DELLA PRODUZIONE INTEGRATA

Partecipazione

Ogni produttore e ogni azienda commerciale che intende partecipare al programma AGRIOS entro 28 febbraio di ogni anno deve presentare ad un Organismo di Certificazione competente ed indipendente una richiesta di partecipazione per iscritto nella cui dichiara che:

- è a conoscenza delle direttive e le segue volontariamente sotto la propria responsabilità,
- consente l'effettuazione di tutti i controlli e le analisi previste e
- riconosce le decisioni dell'Organismo di Certificazione.

Tutta l'azienda frutticola deve seguire il programma di produzione integrata (coscienza ecologica del conduttore dell'azienda). Tutte le cure colturali agronomiche eseguite dopo la fine della raccolta hanno già efficacia per la nuova raccolta e devono essere trasferite nell'attuale quaderno di campagna. Per tutti gli interventi effettuati prima dell'entrata in vigore delle presenti direttive valgono le prescrizioni e le sanzioni delle direttive precedenti.

Il conduttore dell'azienda deve fare in modo, che i frutteti AGRIOS non vengano contaminati da sostanze non consentite (miscela antiparassitaria in acqua residua dell'atomizzatore, deriva da frutteti confinanti ed altro).

Ogni produttore tramite l'azienda commerciale competente, entro il 31 maggio di ogni anno trasmette all'Organismo di Certificazione una lista aggiornata delle superfici a frutteto notificate per l'iscrizione. Nel caso in cui si dovessero verificare successivamente variazioni dei dati colturali trasmessi oppure dei rapporti di possesso relativi ai frutteti notificati, esse dovranno essere comunicate all'Organismo di Certificazione entro 15 giorni.

Disdette

Disdette possono essere eseguite presso l'Organismo di Certificazione per singoli appezzamenti o l'intera azienda.

Disdette parziali verranno accettate solo se nell'ambito d'un frutteto vi è una chiara delimitazione e si può escludere una contaminazione dei filari circostanti. Sono chiaramente delimitati ad es. appezzamenti di una varietà (alberi della medesima età con almeno 5-6 file concomitanti) o superfici separate da confini naturali (strade, fossi, siepi, ecc.).

Facendo disdette parziali, è da presentare uno schizzo del frutteto dal quale risulta il corrispondente appezzamento, la superficie e la zona circostante. L'Organismo di Certificazione esamina le domande delle disdette e si riserva l'accettazione o il rifiuto delle stesse. Una copia del modulo di disdetta è da allegare al quaderno di campagna.



La disdetta deve essere comunicata attraverso l'azienda commerciale prima, oppure immediatamente dopo una **cura culturale non prevista** dalle direttive, presentando il relativo modulo. Dopo la comunicazione di una ispezione o solo al momento del controllo le disdette non vengono più accettate.

Attuazione della produzione integrata



a) Responsabile aziendale

Ogni azienda deve nominare un responsabile aziendale, a cui è attribuita la responsabilità dell'attuazione della produzione integrata, soprattutto di tutte le applicazioni di fitofarmaci e concimi. Il responsabile aziendale deve anche assicurare, che le responsabilità e le competenze vengano comunicate all'interno dell'azienda.

b) Approvvigionamento di prodotto

Qualora le aziende commerciali si approvvigionino di prodotti da produzione integrata direttamente dalle aziende agricole, deve esistere un accordo di fornitura oppure una denuncia della raccolta stimata ed una richiesta di partecipazione al programma.

Qualora le aziende commerciali si approvvigionino da altre aziende commerciali, dai documenti di trasporto deve risultare, che si tratta di prodotti da produzione integrata.

c) Non conformità, azioni correttive e preventive e reclami

Le aziende devono registrare le non conformità rilevate e le azioni intraprese in merito. Inoltre devono assicurare, che i prodotti non conformi non vengono messi in circolazione come prodotto AGRIOS.

Le aziende devono attuare e registrare le azioni correttive e preventive e verificare la loro efficacia.

Le aziende devono documentare la gestione dei reclami.

d) Autocontrollo

Le aziende devono verificare in autocontrollo almeno una volta all'anno la corretta applicazione delle direttive e documentarne l'esito. Nelle aziende agricole questo deve avvenire prima del controllo dei raccoglitori aziendali.

e) Verifica interna

Le aziende commerciali devono valutare almeno una volta all'anno l'efficacia del sistema della produzione integrata. Tale verifica dev'essere effettuata da una persona indipendente rispetto all'attività verificata. In base agli esiti dell'autocontrollo, della verifica interna e degli eventuali reclami e non conformità in caso di necessità devono essere attuate azioni correttive.

La documentazione delle aziende agricole viene controllata dal personale dell'azienda commerciale al momento della consegna del raccoglitore aziendale.

Quaderno di campagna



I frutticoltori che attuano la produzione integrata devono documentare tutte le pratiche colturali, che hanno rilevanza sull'ambiente stesso, in un apposito **quaderno di campagna** per la dimostrazione di una produzione rispettosa per l'ambiente. Il quaderno di campagna può essere tenuto sia in forma cartacea che in forma digitale. Le registrazioni devono essere conservate per almeno dieci anni.

Il frutticoltore deve riportare costantemente nel quaderno di campagna le diverse cure colturali che esegue nel proprio frutteto.

Devono essere sempre annotate le seguenti indicazioni:



- la descrizione del frutteto (corrispondente all'estratto del catasto frutticolo)
- data inizio fioritura (per ogni varietà)
- data fine fioritura degli impianti nuovi
- data inizio raccolta (per ogni varietà)
- produzione stimata
- trattamenti: data, prodotto (denominazione riportata sull'etichetta), quantità, motivo (per es. insetti dannosi/malattie, diradamento ecc.)
- concimazione: data, prodotto (denominazione riportata sull'etichetta), contenuto di elementi nutritivi, quantità
- erbicidi: data, prodotto (denominazione riportata sull'etichetta), quantità

- irrigazione
- lotta contro i roditori
- conteggio degli insetti utili, degli insetti dannosi e delle malattie
- cure colturali ecologiche eseguite

Nel quaderno di campagna può essere annotata anche la data di fine fioritura degli impianti in produzione. Se non vi è riportata alcuna data, per i controlli viene applicata la data fissata dall'Ufficio Frutti-Viticultura.



Il quaderno di campagna deve essere regolarmente aggiornato e sempre disponibile per controlli. Anche tutte le cure colturali agronomiche eseguite dopo la fine della raccolta come ad esempio la concimazione autunnale, l'impiego degli erbicidi o la lotta contro i roditori devono essere riportate nell'attuale quaderno di campagna e trasferite nel quaderno di campagna per l'anno seguente.

CONTROLLI E SANZIONI NELLA PRODUZIONE INTEGRATA

Tipo dei controlli

Controlli in azienda

Una parte degli iscritti durante la stagione frutticola sarà sottoposta ad un controllo aziendale secondo le indicazioni del piano di controllo. Le aziende, presso le quali saranno eseguiti i controlli, saranno scelte dall'Organismo di Certificazione.

Controlli del raccogliitore aziendale

I raccoglitori aziendali di tutte le aziende, comprese le registrazioni nei quaderni di campagna, saranno controllati in due momenti durante la stagione. Il primo controllo avviene prima che incominci la raccolta e il secondo dopo l'ultimo trattamento eseguito.

Controlli nei magazzini

All'inizio della stagione commerciale in ognuno dei magazzini sarà eseguito un controllo preliminare e durante la stagione saranno eseguiti ulteriori controlli.

Consistenza dei controlli

Controlli dall'Organismo di Certificazione	
Controllo	Punti da controllare
Verifica del raccogliitore aziendale e delle registrazioni del quaderno di campagna	• completezza delle registrazioni • rispetto delle direttive AGRIOS
Controllo dell'atomizzatore	• partecipazione al controllo funzionale dell'atomizzatore • allestimento con le attrezzature tecniche necessarie per trattamenti a deriva ridotta
Verifica del deposito dei fitofarmaci	• rispetto delle disposizioni per una conservazione dei fitofarmaci a regola d'arte • giacenza dei fitofarmaci (concordanza con la lista dell'inventario, presenza di prodotti non più consentiti) • rispetto delle disposizioni per smaltire correttamente le confezioni vuote ed i resti dei prodotti in giacenza
Controllo nei frutteti	• corrispondenza delle superfici esaminate con quelle dichiarate

	• larghezza delle strisce soggetto al diserbo • esecuzione delle misure ecologiche
Prelievo di campioni di foglie, frutta, terreno e vegetazione	• analisi dei residui dei fitofarmaci
Verifica in magazzino	• identificazione precisa e chiara della frutta da produzione AGRIOS • rintracciabilità del prodotto • separazione dei circuiti dei prodotti

Risultato dei controlli

Nei controlli aziendali e dei magazzini di conservazione il tecnico incaricato compilerà un protocollo, di cui una copia sarà consegnata ogni volta al responsabile dell'azienda.

Nel caso in cui sia accertata una mancata conformità alle Direttive, sarà applicata la sanzione prevista per quel caso.

Sanzioni per le aziende agricole

La certificazione per l'appezzamento/parte dell'appezzamento interessato non viene rilasciata rispettivamente ritirata nei seguenti casi:

- Nel quaderno di campagna si trova registrato l'impiego di principi attivi non ammessi dal programma AGRIOS. Qualora si tratti solamente di un errore di trascrizione, il produttore entro quattro giorni di calendario dalla notifica lo può dichiarare per iscritto e richiedere a proprie spese un'analisi di residui. Se il risultato dell'analisi non evidenzia la presenza di un residuo del principio attivo in questione, si procede alla certificazione dell'appezzamento interessato. Se l'esito dell'analisi tuttavia conferma le registrazioni, la certificazione non viene rilasciata oppure ritirata per l'intera azienda agricola.
- Nel quaderno di campagna si trova registrato l'impiego di prodotti fitosanitari non consentiti il cui principio attivo è ammesso dal programma AGRIOS. Qualora si tratti solamente di un errore di trascrizione, il produttore può dichiararlo per iscritto. Se è in grado di dimostrare l'errore in modo convincente entro quattro giorni di calendario dalla notifica presentando le schede di magazzino, i documenti di trasporto e/o le fatture, si procede alla certificazione dell'appezzamento interessato.
- Dalle analisi sono messi in evidenza valori di residui che superano i valori massimi fissati da AGRIOS.
- Le manchevolezze eventualmente riscontrate durante controlli precedenti non vengono eliminate nei termini previsti.
- Non è stato adempito all'obbligo di partecipare ad un corso d'addestramento entro un determinato periodo.

La certificazione per l'intera azienda agricola non viene rilasciata rispettivamente ritirata nei seguenti casi:

- Si rifiuta l'esecuzione dei controlli, oppure, senza giustificarne il motivo, il rappresentante aziendale responsabile non si presenta ad uno dei controlli richiesti.
- Tramite un'analisi sui residui sono stati trovati residui d'un principio attivo non ammesso dal programma.
- Dal quaderno di campagna risulta che l'azienda nell'anno corrente e nell'anno scorso non ha rispettato le misure per la protezione delle api.
- L'atomizzatore non soddisfaceva i requisiti prescritti per la tecnica d'applicazione a deriva ridotta (attrezzature, prescrizioni per impianti ad aiuole o a file multiple, condizioni di proprietà consentite).
- I documenti presentati sono stati manipolati o falsificati.

La certificazione AGRIOS per le partite interessate non viene rilasciata rispettivamente ritirata nei seguenti casi:

- Dal quaderno di campagna risulta che non sono stati rispettati i tempi di carenza.

Un avviso con la condizione di eliminare una manchevolezza accertata entro un determinato periodo di tempo è previsto nei seguenti casi:

- Le annotazioni nel raccoglitore aziendale sono incomplete.
- Nel raccoglitore aziendale manca qualche documento necessario.
- Il controllo funzionale dell'atomizzatore manca, oppure è stato fatto oltre i 5 anni precedenti.
- Le analisi del terreno mancano, oppure sono state fatte oltre i 5 anni precedenti.
- La conferma di adesione a un'organizzazione di consulenza manca.
- Il deposito dei prodotti fitosanitari contiene prodotti non più ammessi.
- Il deposito dei prodotti fitosanitari non è conforme alle disposizioni.
- In un rilievo di campo si è trovata l'esecuzione di una pratica agricola (difesa delle piante, trattamento erbicida, concimazione ecc.), che non figura nelle annotazioni del quaderno di campagna.

Un avviso con l'obbligo di partecipare ad un corso d'addestramento relativo alla tematica entro un determinato periodo di tempo è previsto nei seguenti casi:

- Dal quaderno di campagna risulta che non sono state rispettate le limitazioni all'impiego dei prodotti fitosanitari imposte dal programma (per es. il numero massimo dei trattamenti, il termine ultimo per determinati principi attivi, dosi massime ammesse).
- Dal quaderno di campagna risulta che non sono state rispettate le limitazioni all'impiego dei concimi imposte dal programma (per es. il periodo dell'applicazione, quantitativo di elementi nutritivi massimo ammesso per somministrazione e per anno).
- Dal quaderno di campagna risulta l'impiego di concimi non ammessi dal programma. Qualora si tratti solamente di un errore di trascrizione, il produttore può dichiararlo per iscritto. Se è in grado di dimostrare l'errore in modo convincente entro quattro giorni di calendario dalla notifica presentando le schede di magazzino, i documenti di trasporto e/o le fatture, non deve partecipare al corso.
- Dal quaderno di campagna risulta che non sono state rispettate le limitazioni all'impiego dell'irrigazione imposte dal programma (ad es. quantità massima di acqua per somministrazione, ricorso all'irrigazione per scorrimento per impianti frutticoli messi a dimora a partire dal 2021).
- Un'analisi sui residui evidenzia la presenza d'un principio attivo, pure ammesso dal programma, il cui impiego però non risulta registrato nel quaderno di campagna.
- Dal quaderno di campagna risulta che nell'anno corrente non sono state rispettate le misure per la protezione delle api. Se la stessa azienda già nell'anno scorso non ha rispettato le misure per la protezione delle api, la certificazione per l'intera azienda agricola non viene rilasciata rispettivamente ritirata.
- Ad un controllo in azienda viene accertata una violazione delle prescrizioni delle direttive (per es. larghezza eccessiva della striscia investita dal diserbo chimico, smaltimento inadeguato di rifiuti di prodotti fitosanitari).

Un controllo aggiuntivo con il prelievo di un campione per un'analisi sui residui è previsto nei seguenti casi:

- Le registrazioni nel quaderno di campagna appaiono incompleti o non plausibili. Qualora il risultato dell'analisi sui residui conferma che le registrazioni nel quaderno di campagna non sono completi, il produttore deve sostenere i costi per il controllo aggiuntivo e per l'analisi chimica. Se il risultato dell'analisi tuttavia non conferma il sospetto, al produttore non vengono addebitati i costi aggiuntivi.

Sanzioni per i centri di condizionamento/commercializzazione

Nel caso in cui dai controlli nei centri di condizionamento/commercializzazione si accerti una non conformità alle Direttive sono previste le seguenti sanzioni:

- Il blocco della merce non conforme.
- La merce bloccata dovrà essere tolta dalle confezioni già preparate ovvero liberata dalle etichette non conformi.
- Le misure correttive accordate dovranno essere applicate correttamente.
- La non conformità viene inoltrata all'AGRIOS e dalla stessa ulteriormente sanzionata.

Linee guida nazionali per la produzione integrata 2026

Difesa integrata e controllo integrato delle infestanti - G.T.S. „Comitato nazionale per la difesa integrata”
Ministero per le politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto Ministeriale n. 2722 del 17/4/2008

Annotazione relativa alle tabelle:

Per distinguere i consigli tecnici dagli impegni vincolanti, quest'ultimi sono evidenziati in **grassetto** su fondo giallo.

AVVERSITÀ	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i>)	<u>Interventi chimici:</u> Cadenzare i trattamenti a turno biologico, oppure adottare un turno fisso o allungato in funzione dell'andamento climatico e della persistenza del fungicida. Interrompere i trattamenti antiticchiolatura, o ridurli sensibilmente, dopo la fase del frutto noce se nel frutteto non si rilevano attacchi di ticchiolatura.	Polisolfuro di calcio Trifloxystrobin (1) Pyraclostrobin (1) Boscalid (2)(*) IBE in nota (3) Pyrimethanil (4) Cyprodinil (4) Captano (5) Ditianon (5) Fluazinam (6) Dodina (7) Penthiopyrad (8)(*) Prodotti rameici (9) Fluxapyroxad (10)(*) Fosfonato di potassio (11) Bacillus subtilis Zolfo Bicarbonato di potassio Olio essenziale di arancio Laminarin	(1) Al massimo 3 interventi con strobilurine all'anno indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (3) Al massimo 7 interventi con IBE all'anno indipendentemente dall'avversità, al massimo 1 ulteriore intervento con Difenconazolo o Mefentrifluconazolo contro la ticchiolatura in aggiunta agli IBE previsti, al massimo 2 interventi con Mefentrifluconazolo all'anno (4) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (5) Tra Captano e Ditianon indipendentemente dall'avversità al massimo 18 interventi all'anno (6) Al massimo 6 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (7) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (8) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (9) Al massimo 4 kg di sostanza attiva per ha all'anno compresi i fertilizzanti a base di rame (10) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (11) Tra Fosetil alluminio e Fosfonato di potassio al massimo 10 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità

AVVERSITÀ	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Mal bianco (<i>Podosphaera leucotricha</i> , <i>Oidium farinosum</i>)	<u>Interventi agronomici:</u> asportare durante la potatura invernale i rametti con gemme oidiate ed eliminare in primavera - estate i germogli colpiti <u>Interventi chimici:</u> sulle varietà più recettive e nelle aree di maggior rischio intervenire preventivamente sin dalla prefioritura, mentre negli altri casi attendere la comparsa dei primi sintomi	Zolfo IBE in nota (1) Pyraclostrobin (2) Boscalid (3)(*) Trifloxystrobin (2) Cyflufenamid (4) Penthiopyrad (5)(*) Bupirimate (6) Fluxapyroxad (7)(*) Meptyldinocap (8) Bicarbonato di potassio Polisolfuro di calcio Bacillus amyloliquefaciens Olio essenziale di arancio Laminarin	(1) Al massimo 7 interventi con IBE all'anno indipendentemente dall'avversità, al massimo 1 ulteriore intervento con Difenconazolo o Mefentrifluconazolo contro la ticchiolatura in aggiunta agli IBE previsti, al massimo 2 interventi con Mefentrifluconazolo all'anno (2) Al massimo 3 interventi con strobilurine all'anno indipendentemente dall'avversità (3) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (4) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (5) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (6) Al massimo 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (7) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (8) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, solo nel periodo compreso dallo stadio di orecchiette di topo e l'inizio della fioritura
Cancro e disseccamenti rameali (<i>Nectria galligena</i>)	<u>Interventi chimici:</u> di norma si prevede una applicazione autunnale poco prima della defogliazione ed una primaverile, ad ingrossamento gemme. Nei frutteti giovani od in quelli gravemente colpiti è opportuno intervenire in autunno anche a metà caduta foglie.	Prodotti rameici (1)	(1) Al massimo 4 kg di sostanza attiva per ha all'anno compresi i fertilizzanti a base di rame
Marciume del colletto (<i>Phytophthora spp.</i>)	<u>Interventi chimici</u> Intervenire in modo localizzato solo nelle aree colpite Intervenire dopo la ripresa vegetativa. Evitare i ristagni idrici, favorire i drenaggi.	Prodotti rameici (1) Fosetil alluminio (2)	Al massimo 2 interventi all'anno contro questa avversità (1) Al massimo 4 kg di sostanza attiva per ha all'anno compresi i fertilizzanti a base di rame (2) Tra Fosetil alluminio e Fosfonato di potassio al massimo 10 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità

AVVERSITÀ	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Marciumi (<i>Gloeosporium album</i>)	Interventi chimici Solo in preraccolta	Captano (1) Pyraclostrobin (2) + Boscalid (3)(*) Fludioxonil (4)	(1) Tra Captano e Ditianon indipendentemente dall'avversità al massimo 18 interventi all'anno (2) Al massimo 3 interventi con strobilurine all'anno indipendentemente dall'avversità (3) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (4) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Colpo di fuoco (<i>Erwinia amylovora</i>)	Soglia Vedi soglie d'intervento raccomandate dagli enti di consulenza locali	Prodotti rameici (1) Bacillus subtilis Aureobasidium pullulans Bacillus amyloliquefaciens Laminarin	(1) Al massimo 4 kg di sostanza attiva per ha all'anno compresi i fertilizzanti a base di rame
Alternaria (<i>Alternaria spp.</i>)	Interventi chimici Solo in preraccolta	Pyraclostrobin (1) Boscalid (2)(*) Fludioxonil (3) Penthiopyrad (4)(*) Fluazinam (5) Mefentrifluconazolo (6)	(1) Al massimo 3 interventi con strobilurine all'anno indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (3) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (4) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (5) Al massimo 6 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (6) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Glomerella Leaf Spot Marciume amaro (<i>Colletotrichum spp.</i>)	Interventi agronomici Evitare irrigazione soprachioma Favorire la degradazione delle foglie nel periodo post-raccolta	Fludioxonil (1)	(1) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Nota: IBE ammessi: Penconazolo, Tetraconazolo, Difenconazolo, Mefentrifluconazolo.			
(*) Indipendentemente dall'avversità tra Boscalid, Fluxapyroxad e Penthiopyrad al massimo 4 interventi all'anno			

AVVERSITÀ	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Cocciniglia di San Josè (<i>Comstockaspis pernicios</i>)	Soglia Presenza A fine inverno, in caso di presenza, trattare alla migrazione delle neanidi	Olio minerale Pyriproxifen (1)	(1) Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità solo in prefioritura
Afide Grigio (<i>Dysaphis plantaginea</i>)	Soglia Presenza	Tau-Fluvalinate (1) Acetamiprid Flonicamid (2) Flupyradifurone (3) Pirimicarb Azadiractina Sali potassici di acidi grassi	(1) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità (3) Al massimo 1 intervento ad anni alterni indipendentemente dall'avversità
Pandemis e Archips (<i>Pandemis cerasana</i> , <i>Archips podanus</i> , <i>Adoxophyes orana</i> , <i>Pandemis heparana</i>)	Soglia Postfioritura: 2 larve/100 getti Estate: 3 larve/500 frutti	Confusione e disorientamento sessuale Bacillus thuringiensis Spinosad (1) Clorantraniliprole (2) Emamectina benzoato (3) Tebufenozide (4)	Trappole aziendali o reti di monitoraggio (1) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (3) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (4) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)	Privilegiare l'impostazione della difesa sul metodo della confusione e del disorientamento sessuale Soglia Prima generazione: in base ai modelli previsionali o alle catture delle trappole Generazioni successive: dopo controlli su almeno 500 frutti/ettaro sui quali vengono conteggiati i fori di penetrazione: giugno - 3 frutti perforati/1.000 luglio - 5 frutti perforati/1.000 agosto - 8 frutti perforati/1.000	Confusione e disorientamento sessuale Virus della granulosi Spinosad (1) Clorantraniliprole (2) Emamectina benzoato (3) Tebufenozide (4) Acetamiprid (5)	Trappole aziendali o reti di monitoraggio (1) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (3) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (4) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità

AVVERSITÀ	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Cidia del Pesco (<i>Cydia molesta</i> , <i>Grapholita molesta</i>)	Soglia Ovideposizioni o 1% di fori di penetrazione verificati su almeno 100 frutti a ettaro.	Bacillus thuringiensis Confusione e disorientamento sessuale Spinosad (1) Clorantraniliprole (2) Emamectina benzoato (3) Virus della granulosi	(1) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (3) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Fillominatori (<i>Lithocolletis blancardella</i>) (<i>Leucoptera scitella</i>) (<i>Phyllonorycter corylifoliella</i>) (<i>Lyonetia clerkella</i>)	Soglia Cemiostoma: 5-6 mine/pianta Litocollete: 1 mina per getto lungo Litocollete delle foglie di nocciolo: 1 mina per getto lungo Minatrice bianca: 1 mina per getto lungo	Acetamiprid Spinosad (1) Clorantraniliprole (2) Emamectina benzoato (3) Azadiractina	(1) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (3) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Rodilegno giallo (<i>Zeuzera pyrina</i>)		Confusione e disorientamento sessuale	
Ragnetto rosso (<i>Panonychus ulmi</i>) Ragnetto giallo (<i>Tetranychus urticae</i>)	Soglia Vedi soglie d'intervento raccomandate dagli enti di consulenza locali	Pyridaben Exitiazox Tebufenpirad Milbemectina Olio minerale Acequinocyl (1) Sali potassici di acidi grassi	Contro queste avversità al massimo 2 interventi all'anno, interventi con olio minerale non vengono considerati per la limitazione (1) Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Eriofidi (<i>Aculus schlechtendali</i>)		Olio minerale Zolfo	
Afide verde (<i>Aphis pomi</i>)		Azadiractina Acetamiprid Flonicamid (1) Flupyradifurone (2) Pirimicarb Sali potassici di acidi grassi Olio minerale Piretrine	(1) Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 1 intervento ad anni alterni indipendentemente dall'avversità

AVVERSITÀ	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Afide lanigero (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	Soglia 10 colonie vitali su 100 organi controllati con infestazioni in atto Verificare la presenza di <i>Aphelinus mali</i> che può contenere efficacemente le infestazioni	Acetamiprid Flupyradifurone (1) Pirimicarb Beauveria bassiana	(1) Al massimo 1 intervento ad anni alterni indipendentemente dall'avversità
Psille (<i>Cacopsilla melanoneura</i>) (<i>Cacopsilla picta</i>)		Etofenprox (1) Tau-Fluvalinate (2) Piretrine Azadiractina Sali potassici di acidi grassi	(1) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, di cui almeno 1 trattamento in prefioritura (2) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
Maggiolino (<i>Melolontha melolontha</i>)	Soglia Vedi soglie d'intervento raccomandate dagli enti di consulenza locali e solo negli anni di volo	Acetamiprid	
Mosca della frutta (<i>Ceratitis capitata</i>)	Soglia Presenza di prime punture	Acetamiprid Etofenprox (1) Lambda-cialotrina (2) Deltametrina (2) Esfenvalerate (2)	(1) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, di cui almeno 1 trattamento in prefioritura (2) Utilizzo solo in trappole per la cattura massale
Cimice asiatica (<i>Halyomorpha halys</i>)	Soglia Vedi soglie d'intervento raccomandate dagli enti di consulenza locali	Acetamiprid Tau-Fluvalinate (1) Ettofenprox (2) Deltametrina (3) Piretrine	(1) Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità (2) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, di cui almeno 1 trattamento in prefioritura (3) Al massimo 1 intervento all'anno indipendentemente dall'avversità
Cicaline	Soglia Presenza	Ettofenprox (1) Azadiractina Olio essenziale di arancio	(1) Al massimo 3 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, di cui almeno 1 trattamento in prefioritura
Metcalfa (<i>Metcalfa pruinosa</i>)		Acetamiprid Olio minerale	

AVVERSITÀ	CRITERI D'INTERVENTO	S.A. E AUSILIARI	NOTE E LIMITAZIONI D'USO
Sesia del melo (<i>Synanthedon myopaeformis</i>)		Azadiractina Olio minerale Steinernema feltiae Cattura massale con trappole attrattive	
Topi Arvicole		Fosfuro di zinco	

CRITERI D'INTERVENTO	ATTIVITÀ	INFESTANTI	SOSTANZA ATTIVA
Interventi agronomici: Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno Non ammesse: Lavorazioni nelle interfile di impianti dotati di sistemi di irrigazione	Fogliare (post-emergenza infestanti)	Dicotiledoni e graminacee	Glifosate (1) Acido pelargonico 2,4-D (2)
Interventi chimici: Non ammessi interventi chimici nelle interfile Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.		Dicotiledoni	Carfentrazone-etile (3) Pyraflufen-etile Fluroxypyr (4) MCPA (5)
L'uso di diserbanti può essere opportuno quando: - Vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m 1,5 / 2 - Le piante abbiano apparato radicale superficiale (es. per i il pero portainnesti cotogni e BA29 - per il melo M9 e M26) - Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%) - Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici. Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L'area trattata non deve quindi superare 30% dell'intera superficie.		Graminacee	Clethodim Cycloxydim Fluazifop-p-butile Quizalofop-p-etile Propaquizafop
(1) Al massimo 9 l/ha/anno con formulati a 360 g/l, se si usano erbicidi fogliari; al massimo 6 l/ha/anno se si usano erbicidi residuali. Al massimo 1 trattamento all'anno entro un'ora dal taglio con prodotti commerciali che prevedono l'uso come devitalizzante. (2) Impiegabile in alternativa a MCPA, al massimo 1 intervento all'anno, solo in miscela con Glifosate (3) Per ogni singolo intervento la dose è di 0,3 l/ha come erbicida e 1 l/ha come spollonante. (4) Al massimo 1 intervento all'anno (5) Impiegabile in alternative a 2,4-D (6) Da fine inverno fino all'inizio fioritura (7) Tra Oxifluorfen, Pendimetalin, Propyzamide e Diflufenican al massimo 1 intervento all'anno	Residuale (pre-emergenza infestanti)	Dicotiledoni	Isoxaben (6)
		Dicotiledoni e graminacee	Oxifluorfen (7) Pendimetalin (7) Propyzamide (7) Diflufenican (7) Clomazone Flazasulfuron

FITOREGOLATORI

ATTIVITÀ	PRINCIPIO ATTIVO IMPIEGABILE	NOTE E LIMITAZIONI D'USO	ALTERNATIVA AGRONOMICA (PROPOSTA)
Allegante	Gibberelline (A4+A7) Gibberelline (A4+A7) + 6-Benziladenina	Impiego limitato in caso di rischio di danno da freddo	Utilizzo di bombi e api
Anticascola	NAA	Si raccomanda di utilizzarli solo in relazione a parametri territoriali oggettivi (Cvs, andamento climatico e/o parametri di maturazione)	
Antiruggine	Gibberelline (A4+A7)e Gibberelline (A4+A7) + 6-Benziladenina		
Contenimento della vigoria (Regolatore dei processi di crescita della pianta)	Prohexadione calcium		
	NAA	Vincolato a condizioni climatiche avverse	
Diradante	6-Benziladenina		Integrazione con diradamento manuale
	NAA		Integrazione con diradamento manuale
	6-Benziladedina + NAA		Integrazione con diradamento manuale
	NAD		Integrazione con diradamento manuale
	Etefon		Integrazione con diradamento manuale
	Metramitron	Al massimo 2 interventi all'anno	Integrazione con diradamento manuale
Favorisce uniformità frutti	Gibberelline (A4+A7) Gibberelline (A4+A7) + 6-Benziladenina		Integrazione con diradamento manuale

Lista dei principi attivi per la produzione frutticola integrata 2026

Nelle seguenti liste accanto ai principi attivi sono elencati come esempio alcuni nomi commerciali noti. Il produttore, prima dell'utilizzo di un fitofarmaco non elencato, deve assicurarsi che questo sia autorizzato per l'impiego programmato.

I dosaggi massimi per i prodotti fitosanitari indicati nelle seguenti liste sono quelle riportati nelle etichette disponibili al momento dell'approvazione delle direttive. Per eventuali errori o imprecisioni si declina ogni responsabilità. Per alcuni fitofarmaci i dosaggi variano in funzione dell'avversità controllata e del momento dell'applicazione. Le relative indicazioni riportate nelle etichette devono essere rispettate.

INSETTICIDI

Principio attivo	Nome commerciale	Nr. mass. trattamenti all'anno	Dose massima		Tempo di carenza in giorni	Annotazioni
			per hl	per ha		
Acetamiprid	Epik SL,	1	150 ml	1,5 l	30	
	Gazelle,	1	150 g	1,5 kg	30	
	Kestrel,	2	35 ml	0,25 l	21	
	Kipe 50 SL	1	150 ml	1,5 l	30	
Azadiractina	Bemotius,	3	-	1,5 l	3	
	Neemazal-T/S,	3	-	3 l	3	
	Neemik Ten,	3	400 ml	3,9 l	3	
	Oikos	3	150 ml	1,5 l	3	
Bacillus thuringiensis	Agree,	3	200 g	2 kg	2	
	Bac MK,	2	125 g	2 kg	3	
	Belthirul,	2	125 g	1 kg	3	
	Biobit DF,	8	100 g	1,5 kg	2	
	CoStar WG,	6	100 g	1,5 kg	2	
	Delfin,	6	100 g	1 kg	2	
	Design WG,	3	200 g	2 kg	2	
	DiPel DF,	8	100 g	1,5 kg	2	
	Doctrin,	2	125 g	1 kg	3	
	Exitul,	2	125 g	1 kg	3	
	Kristal 32 WG,	8	100 g	1,5 kg	2	
	Lepinox Plus,	-	-	1,5 kg	2	
	Primial WG,	8	100 g	1,5 kg	2	
	Rapax AS,	3	-	2 l	2	
	Sequra WG,	8	100 g	1,5 kg	2	
	Turex,	3	200 g	2 kg	2	
	Turibel,	2	125 g	1 kg	3	
	XenTari WG	4	100 g	1,5 kg	2	
Beauveria bassiana	Naturalis	10	-	2 l	0	
Chlorantraniliprole	Coragen,	2	20 ml	0,3 l	14	Sono ammessi al massimo 2 trattamenti all'anno.
	Pampero,	2	20 ml	0,3 l	14	
	Shenzi 200 SC,	2	20 ml	0,3 l	14	
	Vesticor,	2	20 ml	0,3 l	14	
	Voliam	2	20 ml	0,3 l	14	
Deltametrina	Decis Evo,	1	50 ml	0,7 l	7	È ammesso al massimo 1 trattamento all'anno.
	Decis Trap,	-	-	80 pz.	0	
	Meteor	1	80 ml	-	3	
Emamectina benzoato	Affirm,	2	300 g	4 kg	7	Sono ammessi al massimo 2 trattamenti all'anno.
	Affirm Opti	2	150 g	2 kg	7	
Esfenvalerate	Sumitrap	1	-	75 pz.	0	Solo per l'utilizzo in trappole

Etofenprox	Sword up, Trebon up	3 3	50 ml 50 ml	0,75 l 0,75 l	7 7	Sono ammessi al massimo 3 trattamenti all'anno, di cui almeno 1 trattamento in prefioritura.
Flonicamid	Afinto, Apyza WG, Flonic, Teppeki, Velmeri 500 WG	1 1 1 1 1	- - - - -	0,14 kg 0,14 kg 0,14 kg 0,14 kg 0,14 kg	21 21 21 21 21	È ammesso al massimo 1 trattamento all'anno.
Flupyradifurone	Sivanto Prime	1 ad anni alterni	75 ml	0,9 l	14	È ammesso al massimo 1 trattamento ad anni alterni.
Lambda-cialotrina	Karatetrap C	1	-	80 pz.	0	Solo per l'utilizzo in trappole
Olio essenziale di arancio	Essen'ciel, Limocide, Oro-Quin, Prev-am Plus	6 6 6 6	800 ml 800 ml 800 ml 800 ml	4 l 4 l 4 l 4 l	3 3 3 3	
Olio minerale	Agrumin, Biolid up, Chemol, Eko Oil Spray, EkoOil S, Isard, Ivenol Massò, Oleoter, Oliocin, Oliocin Plus, Opalene Fluid, Ovipron Top, Polithiol, Promanal Agro, Sipcamol E, Ultra Fine Oil, Vernoil	2 2 - - 4 1 - - - 2 2 4 - 2 2 - - -	- 2500 ml 3000 ml 3500 ml 1000 ml 1000 ml 2500 ml - 3500 ml 4000 ml - 3500 ml 5000 ml 1000 ml 4000 ml 2500 ml 3500 ml	20 l 30 l - - 12 l 15 l 37,5 l 60 l - 40 l 20 l 35 l 75 l 15 l 40 l 37,5 l 35 l	0 20 20 20 0 0 1 20 20 20 0 20 20 1 20 1 20	Riposo veget.
Piretrine	Asset Five, Biopiren Plus, Biovis, Flora Verde, Pireflor, Piretro ActiGreen, Pyganic 1.4, Several, Tersus	3 3 3 3 3 3 2 3 2	64 ml 160 ml 160 ml 160 ml 160 ml 160 ml 250 ml 160 ml 250 ml	0,96 l 2,4 l 2,4 l 2,4 l 2,4 l 2,4 l 2,5 l 2,4 l 2,5 l	1 1 1 1 1 1 7 1 7	
Pirimicarb	Aphox 50, Pirimor 17,5, Pirimor 50, Xintech 50	1 1 1 1	75 g 200 g 75 g 75 g	0,76 kg 2,2 kg 0,76 kg 0,76 kg	7 7 7 7	
Pyriproxyfen	Admiral Gold, Brai, Eniful, Expedient 10 EC, Juvinal Gold, Maracana, Proximo, Sinsajo	1 1 1 1 1 1 1 1	40 ml 50 ml 40 ml 50 ml 40 ml 50 ml 50 ml 50 ml	0,6 l 0,5 l 0,6 l 0,5 l 0,6 l 0,5 l 0,5 l 0,5 l	inizio fioritura inizio fioritura inizio fioritura inizio fioritura inizio fioritura inizio fioritura inizio fioritura inizio fioritura	È ammesso al massimo 1 trattamento all'anno, solo prima della fioritura.
Sali potassici di acidi grassi	Ciopper, Flipper, Nobil	5 5 5	2000 ml 2000 ml 2000 ml	10 l 10 l 20 l	0 0 0	

Spinosad	Exsolant,	3	30 ml	0,45 l	7	Sono ammessi al massimo 3 trattamenti all'anno.
	Laser,	3	30 ml	0,45 l	7	
	Laser 120 SC,	3	120 ml	1,8 l	7	
	Success,	3	120 ml	1,8 l	7	
	Tracer 120	3	120 ml	1,8 l	7	
Tau-Fluvalinate	Evure Pro,	2	120 ml	0,6 l	30	Sono ammessi al massimo 2 trattamenti all'anno.
	Mavrik Smart,	2	120 ml	0,6 l	30	
Tebufenozide	Mimic	2	80 ml	0,9 l	14	
Tecnica della confusione	CheckMate CM-XL,	-	-	300 pz.	0	
	CheckMate OFM,	-	-	350 pz.	0	
	CheckMate Puffer CM,	-	-	3 pz.	0	
	CheckMate Puffer CM-Pro,	-	-	3 pz.	0	
	CheckMate Puffer Fruit Multi,	-	-	3 pz.	0	
	CheckMate Puffer OFM,	-	-	3 pz.	0	
	Cidetrak CM,	-	-	500 pz.	0	
	Cidetrak CM Meso,	-	-	1000 pz.	0	
	Cidetrak OFM,	-	-	425 pz.	0	
	Isomate C LR Max TT,	-	-	750 pz.	0	
	Isomate C/OFM,	-	-	1000 pz.	0	
	Isomate C plus,	-	-	1000 pz.	0	
	Isomate C TT,	-	-	500 pz.	0	
	Isomate OFM rosso Flex,	-	-	600 pz.	0	
	Isonet Z,	-	-	300 pz.	0	
	Mister C,	-	-	3 pz.	0	
	Mister C G,	-	-	3 pz.	0	
	Mister C LR	-	-	3 pz.	0	
Virus della granulosi	Carpstop,	3	50 ml	0,75 l	3	
	Carpovirusine Plus,	-	100 ml	1 l	1	
	Madex Top,	10	-	0,1 l	3	
	Madex Twin,	21	-	0,1 l	3	
	Virgo	3	50 ml	0,75 l	3	

ACARICIDI

Principio attivo	Nome commerciale	Nr. mass. trattamenti all'anno	Dose massima		Tempo di carenza in giorni	Annotazioni
			per hl	per ha		
Acequinocyl	Kanemite	1	180 ml	1,8 l	30	È ammesso al massimo 1 trattamento con Acequinocyl all'anno.
Exitiazox	Acaroil SC,	1	30 ml	0,3 l	28	
	Edrizar SC,	1	30 ml	0,3 l	28	
	Flanco SC,	1	30 ml	0,3 l	28	
	Matacar FL,	1	36 ml	0,36 l	28	
	Nissorun,	1	90 g	1 kg	28	
	Picker Flow,	1	30 ml	0,3 l	28	
	Stiker Flow,	1	30 ml	0,3 l	28	
	Tenor SC	1	30 ml	0,3 l	28	
Milbemectina	Milbeknock	2	125 ml	1,875 l	14	
Pyridaben	Nexter	1	75 ml	1 l	14	È ammesso al massimo 1 trattamento con Pyridaben all'anno, le scorte di

						magazzino possono essere consumate fino al 19.05.2026. Sono ammessi al massimo 2 trattamenti contro i ragnetti all'anno, interventi con olio minerale non vengono considerati per la limitazione.
Tebufenpirad	Shinji, Shirudo	1 1	- -	0,5 kg 0,5 kg	7 7	

FUNGICIDI

Principio attivo	Nome commerciale	Nr. mass. trattamenti all'anno	Dose massima		Tempo di carenza in giorni	Annotazioni
			per hl	per ha		
Anilino-pirimidine: Cyprodinil	Cardinal 50 WG, Celerum	3 3	- 100 ml	0,5 kg 0,75 l	60 60	Sono ammessi al massimo 3 trattamenti con Anilino-pirimidine all'anno.
Pyrimethanil	Chorus,	3	50 g	0,75 kg	21	
	Tarlys,	3	100 ml	0,75 l	60	
	Tayrex	3	100 ml	0,75 l	60	
	Brezza,	3	100 ml	1,5 l	56	
	Charco,	3	-	1,5 l	56	
	Papyrus Gold,	3	100 ml	1 l	56	
	Pretil,	3	-	1,5 l	56	
	Pyrimus 400 SC,	3	70 ml	1 l	56	
	Pyrogal,	3	-	1,5 l	56	
	Pyrus 400 SC,	3	70 ml	1 l	56	
	Scala	3	100 ml	1,5 l	7	
Aureobasidium pullulans	Blossom Protect New	9	-	2,25 kg	0	
Bacillus amyloliquefaciens	Amylo-X	6	-	2,5 kg	0	Sono ammessi al massimo 6 trattamenti all'anno.
Bacillus subtilis	Portento,	8	-	1,5 kg	0	
	Serenade Aso	6	-	8 l	0	
Bicarbonato di potassio	Armcarb 85,	5	-	5 kg	1	
	Karma 85,	5	-	5 kg	1	
	Vitikappa	6	500 g	7,5 kg	0	
Bupirimate	Nimrod 250 EW	4	60 ml	0,9 l	14	Solo sul melo, sono ammessi al massimo 4 trattamenti all'anno.
Captano e Ditanon: Captano	Avenger,	7	-	1,88 kg	21	Sono ammessi al massimo 18 trattamenti all'anno con prodotti di questo gruppo.
Ditanon	Capital SH,	7	-	1,88 kg	21	
	Captain 80 WG,	7	-	1,88 kg	21	
	Captan Arvesta 80 WG,	10	180 g	2 kg	21	
	Khapo 80 WG,	7	-	1,88 kg	21	
	Malvin 80 WG,	10	180 g	2 kg	21	
	Merpan 80 WDG,	10	160 g	2 kg	21	
	Orthocide 80 WG	10	180 g	2 kg	21	
	Alcoban,	6	-	0,5 kg	42	
	Bolster Flex,	6	-	0,5 kg	42	
	Caldera,	6	-	0,5 kg	42	
	Deed,	6	-	0,5 kg	21	
	Delan 70 WG,	6	50 g	0,75 kg	42	
	Delan SC,	6	70 ml	1,05 l	56	
	Ditoflo 700 WG,	6	50 g	0,75 kg	42	
	Dyonisus,	6	50 g	0,75 kg	42	

Ditianon + Fosfonato di potassio	Kuki 70,	6	-	0,5 kg	42	Sono ammessi al massimo 10 trattamenti all'anno con Fosetil alluminio e Fosfonato di potassio.	
	Ringo Massò	6	-	0,5 kg	21		
	Delan Pro	6	170 ml	2,5 l	35		
<u>Carbossamidi:</u>							
Boscalid	Bonafide,	3	25 g	0,375 kg	7	Sono ammessi al massimo 3 trattamenti con Boscalid all'anno. Sono ammessi al massimo 3 trattamenti con Fluxapyroxad all'anno. Sono ammessi al massimo 2 trattamenti con Penthiopyrad all'anno. Sono ammessi al massimo 4 trattamenti con Carbossamidi all'anno.	
	Cantus,	3	25 g	0,375 kg	7		
	Filan WG	3	25 g	0,375 kg	7		
	Palator	3	25 g	0,375 kg	7		
	Fluxapyroxad	Sercadis,	3	20 ml	0,3 l		35
		Sercadis SC	3	20 ml	0,3 l		35
Penthiopyrad	Fontelis	2	75 ml	1,125 l	21		
Cyflufenamid	Cidely,	2	50 ml	0,5 l	14	Sono ammessi al massimo 2 trattamenti all'anno.	
	Rebel Top	2	50 ml	0,5 l	14		
Dodina	Syllit 544 SC,	2	85 ml	1,25 l	28	Sono ammessi al massimo 3 trattamenti all'anno.	
	Syllit 65	2	120 g	1,38 kg	40		
Fluazinam	Agharta,	3	100 ml	1 l	60	Sono ammessi al massimo 6 trattamenti all'anno.	
	Banjo,	3	100 ml	1 l	60		
	Embrace,	3	100 ml	1 l	60		
	Fluazinova Plus,	3	-	1 l	60		
	Kelsos,	3	100 ml	1 l	60		
	Morfeo liquido,	3	100 ml	1 l	60		
	Nando maxi,	4	100 ml	1,5 l	63		
	Ohayo	1	100 ml	1 l	60		
Fludioxonil	Geoxe,	2	30 g	0,45 kg	3	Sono ammessi al massimo 2 trattamenti all'anno.	
	Stampa	2	-	0,4 kg	3		
<u>Fosetil alluminio e Fosfonato di potassio</u>							
Fosetil alluminio	Aletil DF,	3	300 g	-	15	Sono ammessi al massimo 10 trattamenti all'anno con prodotti di questo gruppo.	
	Alfil WG,	3	300 g	-	15		
	Aliette,	-	250 g	3,75 kg	28		
	Arpel WG,	3	300 g	-	15		
	Contender Plus,	6	150 g	1,8 kg	40		
	Contender WG,	3	300 g	-	15		
	Elios WG Top,	3	300 g	-	15		
	Fosim,	3	300 g	-	15		
	Golbex WG,	5	375 g	3,75 kg	15		
	Medeiro 80 WDG	3	300 g	-	15		
	Advance,						
	Optix Star Disperss,	5	250 g	3,75 kg	28		
Fosfonato di potassio	Plynio WG	3	300 g	-	15		
	Aquicine,	3	250 ml	2,5 l	35		
	Boing,	3	250 ml	2,5 l	35		
	Century Pro,	6	-	1,9 l	35		
	Mikonos Evo,	3	250 ml	2,5 l	35		
	Savial Forte	3	250 ml	2,5 l	35		

<u>Inibitori della sintesi dell'ergosterolo (IBE):</u>						
Difenoconazolo	Agridif 250,	4	15 ml	-	14	Sono ammessi al massimo 7 trattamenti con IBE all'anno. In aggiunta a questi è ammesso al massimo 1 ulteriore trattamento con Difenoconazolo o Mefentrifluconazolo contro la ticchiolatura.
	Daman,	4	20 ml	0,3 l	14	
	Difcor 250,	4	-	0,15 l	14	
	Difecol,	4	15 ml	0,3 l	14	
	Difenzone,	4	15 ml	-	14	
	Difference,	4	-	0,15 l	14	
	Ditto,	4	15 ml	-	14	
	Divo,	4	15 ml	-	14	
	Driscoll,	4	-	0,15 l	14	
	Mavita 250 EC,	4	15 ml	0,3 l	14	
	Nimbus 250 EC,	4	15 ml	-	14	
	Score 10 WG,	4	37,5 g	0,75 kg	14	
	Shardif 250 EC,	4	15 ml	-	14	
	Sponsor,	4	15 ml	0,3 l	14	
	Vertiaro	4	15 ml	0,3 l	14	
Mefentrifluconazolo	Revyona,	2	-	2 l	28	Sono ammessi al massimo 2 trattamenti con Mefentrifluconazolo all'anno.
	Revsion	2	-	2 l	28	
Penconazolo	Douro 10 WG,	4	40 g	-	14	Con ciascuno degli altri principi attivi sono consentiti al massimo 4 trattamenti all'anno.
	Douro 100 EC,	4	40 ml	-	14	
	Nexol 10 WG,	4	40 g	-	14	
	Pykos,	4	40 g	-	14	
	Radar 10 EC,	3	30 ml	0,5 l	14	
	Radar HP,	3	100 ml	1,5 l	14	
	Scudex,	4	40 ml	-	14	
	Topas 10 EC,	3	30 ml	0,5 l	14	
	Topas 2,5 WG,	3	130 g	2 kg	14	
	Topas 200 EW,	3	16 ml	0,25 l	14	
	Visir Pencotech	4	50 ml	-	14	
Tetraconazolo	Brek,	3	50 ml	0,75 l	14	
	Concorde 40 EW,	3	50 ml	0,75 l	14	
	Domark 125,	4	24 ml	0,24 l	14	
	Domark 125 Plus,	4	24 ml	0,24 l	14	
	Emerald 40 EW,	3	50 ml	0,75 l	14	
	Framex,	3	50 ml	0,75 l	14	
	Galileo,	3	50 ml	0,75 l	14	
	Lidal,	3	50 ml	0,75 l	14	
	Sarumo,	3	50 ml	0,75 l	14	
	Sivil Top,	3	50 ml	0,75 l	14	
	Tomiris 125 EW	4	24 ml	0,24 l	14	
Laminarin	Vacciplant	-	-	1 l	0	
Meptyldinocap	Barkan,	2	60 ml	0,6 l	inizio fioritura	Sono ammessi al massimo 2 trattamenti all'anno nel periodo compreso dallo stadio di orecchiette di topo e l'inizio della fioritura, le scorte di magazzino possono essere consumate quest'anno.
	Karathane Star	2	60 ml	0,6 l	inizio fioritura	
Olio essenziale di arancio	Essen'ciel,	6	800 ml	4 l	3	
	Limocide,	6	800 ml	4 l	3	
	Oro-Quin,	6	800 ml	4 l	3	
	Prev-am Plus	6	800 ml	4 l	3	
Polisolfuro di Calcio	Polisolfuro di Calcio Polisenio,	11	-	22,5 l	30	

	Sapuli	11	-	22,5 l	30	
Rame	Airone Più,	9	420 g	4,2 kg	20	Sono ammessi al massimo 4 kg di sostanza attiva per ha all'anno compresi i fertilizzanti a base di rame.
	Biocupro,	10	1200 ml	12 l	7	
	Bordo 20 Micro,	4	1000 g	5 kg	inizio fioritura	
	Bordo 20 Micro IQV,	4	1000 g	5 kg	inizio fioritura	
	Bordo Isagro WG,	16	600 g	7,5 kg	21	
	Bordoflow New,	10	1200 ml	12 l	7	
	Bussola WG NC,	16	600 g	7,5 kg	21	
	Champ 20 WG,	11	210 g	3,15 kg	inizio fioritura	
	Cobre Nordox Super 75 WG,	16	200 g	2 kg	21	
	Copperfield 17 WG,	11	245 g	3,675 kg	inizio fioritura	
	Coprantol 30 WG,	11	170 g	2,55 kg	inizio fioritura	
	Coprantol Trio,	7	-	8,25 l	inizio fioritura	
	Cupravit Bio Advanced,	11	165 g	2,475 kg	inizio fioritura	
	Cupro Isagro WG,	13	300 g	3,5 kg	21	
	Cuprocaffaro Micro,	13	300 g	3,5 kg	21	
	Cuprofix Ultra Disperss,	-	250 g	3,75 kg	7	
	Cuproram 25 Flow,	12	300 ml	3,5 l	21	
	Cuproram 37,5 WG	13	300 g	3,5 kg	21	
	Cuprosar 40 WDG,	4	500 g	2,5 kg	inizio fioritura	
	Cuprotek Disperss,	-	500 g	7,5 kg	7	
	Cuproxat SDI,	13	313 ml	2,5 l	21	
	Curenox Top Micro,	4	190 g	2,5 kg	inizio fioritura	
	Cutril Top,	7	430 ml	6,45 l	inizio fioritura	
	Cyprus 25 WG,	11	200 g	3 kg	inizio fioritura	
	Cyprus 25 WG Blu,	11	200 g	3 kg	inizio fioritura	
	Evoram 15,	11	280 g	4,2 kg	inizio fioritura	
	Flag,	7	430 ml	6,45 l	inizio fioritura	
	Flowbrix,	8	-	3,2 l	21	
	Grifon Più,	9	420 g	4,2 kg	20	
	Hattrick 30 WG,	11	165 g	2,475 kg	inizio fioritura	
	Heliocuire,	-	350 ml	3,5 l	inizio fioritura	
	Idrorame 193,	16	650 ml	6,5 l	40	
	Idrorame Flow,	16	650 ml	6,5 l	40	
	Input NC,	12	300 ml	3,5 l	21	
	Iperion,	13	300 g	3,5 kg	21	
	King,	16	350 ml	3,5 l	21	
	King 360 HP,	16	350 ml	3,5 l	21	
	Kocide 2000,	-	250 g	-	inizio fioritura	
	Kop-Twin,	16	420 ml	4,2 l	21	
	Neoram Blu WG,	11	350 g	4,5 kg	21	
	Ossiclor 30,	8	400 g	4 kg	21	
	Ossiclor 35 WG,	8	340 g	3,4 kg	21	
	Ossiclor 35 WG Green,	8	340 g	3,4 kg	21	
	Pasta Caffaro Blu,	12	300 ml	3,5 l	21	
	Pasta Caffaro NC,	12	300 ml	3,5 l	21	
	Pasta Isagro Blu	12	300 ml	3,5 l	21	
	Patrol 35 WP,	10	260 g	2,2 kg	21	
	Poltiglia Caffaro 20 DF New,	16	600 g	7,5 kg	21	
	Poltiglia Caffaro 20 GD,	16	600 g	7,5 kg	21	
	Poltiglia Disperss,	-	500 g	7,5 kg	7	
	Poltiglia 20 PB Manica,	8	625 g	6 kg	7	
	Poltiglia 20 WG Green,	8	625 g	6 kg	7	
	Rame Caffaro Blu WG New	11	350 g	4,5 kg	21	
	Rame Isagro WG Blu,	11	350 g	4,5 kg	21	
	S. Ramedit Blu WG,	11	350 g	4,5 kg	21	
	Selecta Disperss,	-	500 g	7,5 kg	7	
	Siaram 20 WG,	16	600 g	7,5 kg	21	

	Solution 20 Disperss, Supracaffaro 30 WG, Tri-Base, Tribasic Flow New, Zetaram 3B FL	- 11 13 7 13	500 g 165 g 313 ml 430 ml 313 ml	7,5 kg 2,475 kg 2,5 l 6,45 l 2,5 l	7 inizio fioritura 21 inizio fioritura 21	
Strobilurine:						
Pyraclostrobin	Cabrio EC	3	-	0,4 l	21	Sono ammessi al massimo 3 trattamenti con Strobilurine all'anno.
Trifloxystrobin	Flint	3	15 g	0,225 kg	14	
Zolfo	Azumo 80 WG, Cosavet DF Edge, Heliosoufre S, Kumulus Tecno, Machairas WG, Microbagnabile WG, Microsulf WG, Microthiol Disperss, Sulfur 80 WG, Thiamon Flow, Thiamon Plus, Thiopron, Tioflor WDG, Tiolene, Tiosol 80 WG, Tiovit 800 L, Tiovit Jet, Tiowetting DF, Zolfo 80 Micronizzato, Zolvis 80 Sector, Zolvis 80 WDG, Zolvis Ottanta WG	6 5 24 10 6 6 6 14 6 8 28 - 6 8 14 8 28 14 16 5 10 14	- - - - 300 g 300 g 300 g - 300 g - - 600 g - 300 g - 500 g - 600 g 500 g 400 g - - -	7,5 kg 7,5 kg 7 l 6 kg 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 7,5 kg 4,5 kg 4 l 9 kg 9 l 4,5 kg 4 l 6 kg 4 l 9 kg 6 kg 4 kg 7,5 kg 6 kg 6 kg	3 0 3 5 5 5 5 0 5 5 0 0 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5	

ERBICIDI

Principio attivo	Nome commerciale	Nr. mass. trattamenti all'anno	Dose massima per ha	Tempo di carenza (in giorni)	Annotazioni
Erbicidi fogliari (post-emergenza infestanti)					
Acido pelargonico	Beloukha	2	16 l	3	
Carfentrazone-etile	Affinity Plus, Spotlight Plus	- -	1 l 1 l	7 7	Al massimo 0,3 l/ha come erbicida, al massimo 1 l/ha come spollonante
Clethodim	Brixton	1	1,33 l	10	
Cycloxydim	Stratos Ultra	-	5 l	28	
Fluazifop-p-butile	Fusilade Max	-	2,5 l	28	
Fluroxypyr	Nitide, Tidex, Tomigan	1 1 1	1,5 l 1,5 l 1,5 l	15 15 15	È ammesso al massimo 1 trattamento all'anno
Glifosate	Barbarian Biograde 360, Barclay Gallup Biograde 360, Clinic ST, Clinic TF, Freeway 360,	- - - - 3	6,33 l 6,33 l 6,33 l 8 l 6,33 l	21 21 21 0 7	Al massimo 9 l/ha/anno con formulati a 360 g s.a./l, se si usano solamente erbicidi fogliari; al massimo 6 l/ha/anno se si usano anche erbicidi residuali.

	Glifene Biograde, Glister Star, Hopper 480, Logrado 360 SL, Logrado 490, Montana 450, Pantox 360 Super, Roundup Future, Roundup Power 2.0, Roundup Ultramax, Taifun MK CL, Tartan, Touchdown, Weedmaster Pro 540	- 3 - 3 - 1 - 3 3 3 3 - - 2	6,33 l 6,33 l 4,75 l 9 l 4,65 l 4,8 l 6,33 l 4,75 l 5 l 3,16 kg 9 l 9 l 6,33 l 2,66 l	21 0 0 28 0 28 21 7 21 7 0 0 21 0	Al massimo 1 trattamento all'anno entro un'ora dal taglio con prodotti commerciali che prevedono l'uso come devitalizzante.
Glifosate + 2,4-D	Kyleo	1	1,5 l	30	Impiegabile in alternativa a MCPA
MCPA	Erbitor M Pro, Fenoxilene 200, Mistral, Regran Extra, U46 M Class, U46 M Star	1 1 1 1 1 1	0,72 l 1,8 l 1,8 l 0,72 l 1,8 l 0,72 l	80 80 80 80 80 80	Impiegabile in alternativa a 2,4-D
Propaquizafop	Agil, Zetrola	1 1	2 l 2 l	30 30	
Pyraflufen-etile	Revolution	2	2 l	30	
Quizalofop-p-etile	Apache, Hanukys, High Top, Leopard 5 EC	1 1 - 1	3 l 3 l 1,25 l 3 l	30 30 35 30	
Erbicidi residuali (pre-emergenza infestanti)					
Clomazone	Rexxar	-	0,5 l	0	
Flazasulfuron	Chikara 25 WG	1	0,024 kg	60	
Diflufenican	Mohican 500 SC	1	0,6 l	0	Tra Diflufenican, Oxifluorfen, Pendimetalin e Propyzamide al massimo 1 intervento all'anno.
Oxifluorfen	Effield SC,	1	0,27 l	0	L'impiego di Oxifluorfen è ammesso solamente nel periodo compreso tra l'ultima decade di settembre e la prima decade di maggio.
	Hereu,	1	0,5625 l	0	
	Hereu SC	1	0,27 l	0	
Pendimetalin	Domitrel 400 CS,	1	3 l	0	
	Prestigan Eko,	1	3 l	0	
	Stomp Aqua	1	2,5 l	0	
Propyzamide	Kerb Flo	1	3,5 l	0	L'impiego è ammesso solamente da novembre a inizio febbraio.
Isoxaben	Gallery	-	1,2 l	0	L'impiego è ammesso da fine inverno fino all'inizio fioritura.

RODENTICIDI

Principio attivo	Nome commerciale	Nr. mass. trattamenti all'anno	Dose massima per ha e anno	Tempo di carenza (in giorni)	Annotazioni
Fosfuro di zinco	Ratron GL,	-	2 kg	-	
	Ratron GW	-	2 kg	-	

ALTRI PRODOTTI CONSENTITI

Principio attivo	Nome commerciale	Nr. mass. trattamenti all'anno	Dose massima		Tempo di carenza in giorni	Annotazioni
			per hl	per ha		
Gibberelline (A4 + A7)	Agrimix GOLD,	-	130 ml	1,3 l	0	
	Gerlagib LG,	-	50 ml	0,5 l	0	
	Gibb Plus,	-	130 ml	1,3 l	0	
	Nectar,	-	50 ml	0,5 l	0	
	Nectar Plus,	-	50 ml	0,5 l	0	
	Novagib,	-	50 ml	0,5 l	0	
	Regulex 10 SG	-	6 g	0,09 kg	20	
Acido naftilacetico (NAA)	Dirager,	1	40 ml	0,4 l	7	
	Fixormon SL,	2	-	0,2 l	7	
	Hergon WP,	-	150 g	2,25 kg	90	
	Monex,	3	100 g	1,5 kg	7	
	Obstauxin,	-	30 ml	0,3 l	7	
6-Benziladenina	Obsthormon 24a	-	30 ml	0,3 l	7	
	Agrimix TOP,	-	100 ml	1,5 l	0	
	Braitex Pro,	-	100 ml	1,5 l	0	
	Brancher Dirado,	-	100 ml	-	0	
	Cylex Plus,	1	750 ml	-	90	
	Exilis,	-	1000 ml	10 l	0	
	GerBAthin 2 LG,	-	1000 ml	10 l	0	
	MaxCel,	1	750 ml	-	90	
6-Benziladenina + Gibberelline (A4 + A7)	MaxCel 2 SL	1	750 ml	-	90	
	Agrimix PRO,	-	90 ml	0,9 l	0	
	Aramis Plus,	-	90 ml	0,9 l	0	
	Perlan,	-	125 ml	1,25 l	0	
	Plis,	-	90 ml	0,9 l	0	
	Profile,	-	125 ml	1,25 l	0	
	Profile Plus,	-	125 ml	1,25 l	0	
	Progerbalin LG,	-	125 ml	1,25 l	0	
	Promalin NT,	-	100 ml	-	0	
Etefon	Prorex	-	90 ml	-	0	
	Ethrel,	2	40 ml	0,6 l	14	
	Gerephon SL	2	40 ml	0,6 l	14	1 trattamento con al massimo 0,6 l/ha oppure 2 trattamenti con al massimo 0,375 l/ha sono ammessi. Solo fino al 15 giugno, solo su melo.
Grasso di pecora	Trico	-	-	20 l	0	
1-MCP	SmartFresh	3	-	-	0	
Metamitron	Brevis	2	-	2,2 kg/ trattamento 4,4 kg/anno	60	Sono ammessi al massimo 2 trattamenti all'anno.
Naftilacetammide (NAD)	Amid Thin W,	-	120 g	1 kg	90	
	Diradone,	-	120 g	1 kg	90	

	Geramid-Neu, Thin Ger 30 SL	- -	200 ml 267 ml	- -	30 7	
Prohexadion-Ca	Corto WG,	2	-	1,25 kg	30	
	Kudos,	2	-	1,25 kg	30	
	Regalis Plus,	-	-	2,5 kg/ trattamento	0	
	Xadion	2	-	3 kg/anno 1,25 kg	30	

BAGNANTI (ESEMPI)

Principio attivo	Nome commerciale	Nr. mass. trattamenti all'anno	Dose massima		Tempo di carenza in giorni	Annotazioni
			per hl	per ha		
Alcool isodecilico etossilato	Bagnante Cifo, Vector	-	100 ml	1 l	0	
		-	100 ml	1 l	0	
Pinolene	Nu-Film-P	-	-	0,4 l	0	
Sorbitan mono oleato etossilato	Bagnante Sariaf, Mago	-	150 ml	1,5 l	0	
		-	150 ml	1,5 l	0	

Elenco dei fertilizzanti

I concimi elencati nelle seguenti liste possono essere impiegati nella produzione integrata. L'elenco aggiornato dei concimi ammessi viene pubblicato sul sito www.agrios.it.

Abenta NT	Aleado WS
Abies Fe	Alex PK
Abilene	Alexin 95 PS
Abyss	Alfaplus
Acadian MPE	Alga Attiva Bio
Acti-Mang 600	Alga Ca
Actiflow B 2.0	Alga Tonic
Actiflow Ca560	Algacifo 3000
Actiflow Green Ca	Algaenergy
Actiflow Green Mg	Algafert eco
Actiflow MgO 500	Algalea Maxima
Actiflow Mn 560	Algaman
Actiflow Zn 680	Algaren Twin
Actinet	Algastrong
Actisel	AlgiCal
Active Dry	Algimag
Active Plus	Algonia
Adimel+ Gold	Algrum
Adivel neutro	Alical
AG-Life	Alika
Agri Bio Aktiv	Amalgerol Essence PB
Agrialgae biologico	Ambition Algae Gen2
Agrialgae fogliare	Amminoalg Bio+
Agrialgae radicale	Ammonium Nitrate
Agrifol P.S. 20-20-20	Amylis Endo
Agriorganico 10%	Antifrost Mo
Agriplant 1 20-5-10 (+2)	Apfel Energy
Agriplant 20-20-20	Aquamin
Agripollina	Aquasatis
Agristallatico	Arpa SOP – Solfato di Potassio
Agro N fluid	Asperium
AgroArgentum Forte	Assorb pH 3.0
AgroCyprum	Atriva 250
AgroFerrum	ATS
Agrofert MB	ATS Kristall 90/20
Agroleaf Power Total 20-20-20	ATS L. (Blütenselekt)
Agrolution pHLow 10-50-10	ATS Top 15
Agrolution Special 13-5-28	Avantgarde
Agrolution Special 14-7-14	Axical
Agrolution Special 14-8-22	Axifert 20 NV
Agromag 9 L Complex	Axifert Final
Agroman 9 L Complex	Axifert Start
Agromaster 15-7-15	Axifert Universal
Agromol 5 L	Axotech
Agros-3	Az Veg
Agrozin 9 L Complex	Az Veg Boro
Akra Blatt	Az Veg Ca-Mg
Akra DGC	Az Veg Molibdeno
Akra Kombi	Azocor 105
Akra Start	Azofol
Alamo	Azolon Fluid 28
Aleado 96	Azoman

Azos 300

Bacillus Mix
 Bactibac
 Barrier Si-Ca
 Base 6.12.18
 Baseball
 Baseos Liq Endo
 Baseos Orga Evergreen
 Basfoliar Avant Natur SL
 Basfoliar Force SL
 Basfoliar Kelp BIO SL
 Basfoliar Plantae Bio SL
 Basic NPK 4-7-19
 Belfrutto MB
 Benefit PZ
 Betabio
 Betabio active
 Biimore
 Bio 20
 Bio Aktiveg
 Bio Att
 Bio Energy
 Bio Energy Veg
 Bio Trix
 Bio Veria Powder
 Bio-D
 Bio-Dung
 Bio-Rex
 BioAgenasol
 Bioaksxter M31 Agricoltura
 Biobacter
 Biocure
 Biofer 25 (TerComposti Spa)
 Biofol Suspension 2
 Bioforge
 Biogesso
 Biokalium
 Biokalium 338
 Biokelp
 Biomit
 Biomit SR
 Biomyz 600
 Bionic CK
 Biopollina
 Biopromoter Ev 3-9
 Biosol
 Biostimolante Alga Special
 Biotrissol NPK 6-5-5
 Bioup FL
 BitterMag
 Biuron
 BIWI
 BlackHum
 Blackjak bio
 Blanka
 Blas

Blattab
 Blaukorn 12-12-17
 Blaukorn Classic
 Blaukorn Premium
 Blaukorn Pro
 Blok 5
 Blok L
 Blok Sinergy
 Bluactive 11.11.16
 BM 86 AA
 Bolikel XP
 Bor PK 17
 Borato di calcio CL
 Borea 300
 Borlanda (Fertenia)
 Boro 6 Ca LG
 Boro KB 19
 Bortrac 100 FL
 Botrifend
 Bryosei
 Butterfill Ca Mg
 Butterfill K
 Butterfill S 33%

Ca' Verde 4F
 Ca' Verde Pollina
 Ca' Verde Stallatico
 Ca" Verde Activa 4-3-3
 CaK Complex
 Cal LS
 Calamag
 Calanit
 Calbit C
 Calce agricola viva – granulato
 Calce agricola viva – macinato
 Calcikorn GS
 Calcio Bio L
 Calcio C
 Calcioenergy
 Calciogreen Forty
 Calciomix
 Calciprill (alghe calcaree)
 Calcisan Green
 Calcisol HQ
 Calcisol Plus
 Calcium Tiller
 Calcypit
 Calibitt
 Calibitt R
 Calibra EU
 Calitech
 Calmag 195
 Calsol
 Caltop 18
 Caltrac 560 Plus
 Calxpro
 Cama 104

Camas	Complex Fruttorto 9.6.18
CAN	Complex Gray 5.8.18+2
Canela	Compost
CaNova	Concentrato liquido da digestato (liquame biogas)
Capfol	Condor
Carbo-Eco Ca	Copper Kela 15 Cu
Carbo-Eco Cu	Cosmo 10-14-17+15
Carbo-Eco Fe	Cosmo 12-5-17
Carbo-Eco K	Cosmo 18-7-9
Carbo-Eco Mg	Cremalga
Carbo-Eco Mn	CreScal Fe-SA
Carbo-Eco Zn	CRF 900
Carbonato di calcio	Crisco
Carrier Cu WDG	Crystalfer
Carrier Fe WDG	Crystalmonio
Carrier Mn	Cubico
Carrier Zn	Cynoyl Z Special
Cell out	Cytomax
Cerbero Green 11-22-30	
Cerbero Green 13-40-13	Daglas
Cerbero Green 15-5-30	DAP 18-46
Cerbero Green 20-20-20	DC 44 0-10-30
Cerbero NPK 15.5.30	DC Borstart 6-10-16
Cerbero NPK 20.20.20	DC Frucht 12-5-15
Cerea Blu	Decco Green Protege
CereaPhos40	Decco Shield
Cerys	Decide
Cerys Natur	Defense
Cet 46 Green	Dentamet
Chelal 3	Dinamico Micro
Chelal Cu	Dingo
Chelal Fe	Dirasol 65S
Chelal Hydro +	Dix Bio
Chelal Hydro NF	Dix natur
Chelal Mg	Dolokorn 90
Chelal Mn	Dolophos 15
Chelal Noor +	Dolophos 16
Chelal Omnical	Dolophos 26
Chelal RD +	Dünger 20
Chelal RD NF	
Chelal Zn	Easyfer
Chelcup 15 Cu	Ecoferro 250 Plus
Chelene	Ecokup Hydro 46
Chelonia Cu93	Ecolenergy Apfel
Cheram	Ecolverdepiù
Cifo KS 64	Eisenchelate 6%
Cigophol K300	eK-Ion MAX
Citocalcium	Ekokel Cu
Citoveg Radicale	Ekokel Man
Citra Grow	Ekokel Zin
Click Horto	EKOprop
Clinsol	EKOprop NX
Clorcal Plus	ELFO combi phyto
Cloruro di calcio CL	EliteSea
Colaticcio	EnerGemma
Colorado	Enrich N3
Complex Blu NPK 12.12.17	Entec 26

Entec perfect 14-7-17	Fito-PK
Entec solub 21	Fito-PK Crystal
Epso Combitop	Fitoman PK
Epso Top	Fitoman PK32
Eptasol	Fitoman Plus
Eranthis	Fitomax-gold
Esamix Mg	Fitostim Alga
Escalante	Fixa Calcium NG
Essemax	Fixa Mn
Esta Kieserit granulare	Fixa Mo
Esta Kieserit polvere	Floral 20.20.20
Euroactiv Agro	Floral K
Euroalg S	Floristar
Eurofert Special	Flow shade
Europlus	Flowplex B
Evohl	Flowplex Ca
Expando	Flowplex Mg
Extractiv	Flowplex Mn
	Flowplex Zn
F1	Fluisol organico
F1 (furos twin)	Folano Ca29
F2	Foliacin
F3	Foliastop Bio
Farben H 50	Folical
Ferade 100	Folicist
Ferade 48	Foliflo BCa
Ferland	Foliflo Excellent
Ferland Trio	Foliflo Mg
Ferri-Chel 100	Foliflo Mn
Ferri+plus 50	Foliflo Zn
Ferrilene Trium	Folur
Ferroman	Fosblend
Ferronove	Fosblend FL
Ferropiù-Mg	Fosfid'or
Ferrostrene Premium	Fosfisan
Fertigonia 10-40-10	Frontiere
Fertigonia 10-5-35	Frubell
Fertigonia 16-8-24	Fructol +
Fertigonia 18-18-18	Fructol NF
Fertigonia 20-20-20	Fruit Max
Fertigonia 25-10-10	Fruttorto
Fertildung	Fruwachs Mg
Fertilpollina	Fuego
Fertilvegetal	Fuentes
Fertimicro Gr	Fulet
Fertiprotec	Fulvin 40-22
Fertiveg Verde	Fumier Humus – S
Fertizolfo Bio	Fungicrops Bio
Ferysol Top 31	Furiak
Fidelius FL	Furiak Plus
Filfert Attivo	FytoFert S
Fill 25-20-15	FytoFert ZS
Fill 26-6-18+2MgO	
FiloCal Calcium	Garvek
FiloCal Foliar Feed	Gen Rame
Fimum Fruchtkalk	Geo-Live
Final K	GER-ATS LG

Gerfos	Humovegetal
Gerfos K	Humovegetal 500
Giove	Hydrofert 15-30-15+2MgO
Glucosei	Hydromag 500
Gold Dry	Hyperkorn 0-26-0
Gorfrut	
Green Power	I'M Bio-Calcio
Green Watersave	Idrofeed 18.11.27
Greenmix	Idrofeed 30.5.10
Greenstim	Idrofloral 15-10-30
Grena Gold 10,5	Idrofloral 20-20-20
Grow More 12-48-8	Idrofloral 35-5-8
Grow More 19-19-19	Idrofloral 8-5-44
Grow More 20-20-20	Idrol-Veg
Grow More 30-10-10	Ilda NPK 10-5-15
Grow More 4-10-46	Ilsac-on
Grow More 9-15-30	IlsaLife
Grumifol	IlsaPolicos
	IlsaVega
Haifa Cal Agri	Ilverde
Haifa Cal GG	Impulsive Premium F
Haifa Cal Prime	inO Cal-250
Haifa DKP	inO Flow-Mg500
Haifa MAG	inO Flow-Mn500
Haifa MAP	inO Flow-Zn680F
Haifa Micro Cu EDTA	inO Green-NMg
Haifa Micro Fe EDDHA 5,2% O-O	inO Soufre-N
Haifa MKP	Intact Nutrix
Haifa NIT	Invita
Haifa ProteK	Iron 4
Haifa SOP	IronGlep 7 WPG
Haifa SOP Bio	Ironleaf Mn
Haifa Top-Iron	Iside
HaifaStim Force	Italpollina
HaifaStim VIM S	
HaifaStim Vital	Jafgreen Frutti
HaifaStim Wall-Up	
HaifaStim Wall-Up S	K-Bomber 56
HaiFer 52	K-Energy
HaiFer Max 60	K-express ZF
Hakaphos Naranja 15-5-30	K-Force
Hascon 12	K-Leaf
Hascon M10	K&A Demon
Hendosar	K&A Evidence 2.0
Hersbrucker Gesteinsmehl	K&A Fort-Soil
HF-Power	K&A sil-ka
Hi-Q Melo	K&A Vitalvega
HiSense	Kalex
HiSense TRP	Kalidos LG
Hold Plus	Kaliente
Hortyflor	Kalis PK
Humic Super	Kalisop gran.
Humifirst sl	Kalisop polvere
Humilig 8-8	Kalitol +
Humipromoter	Kalitol NF
Humostall IV Gamma	Kalkkorn
Humotech	Kally 27

Kamab 26	Letame suino
Kamasol Black	LG 81
Kamasol Ca	Libamin Mix
KAN 27 granulare	Lieta-veg
Kappa G	Ligoplex Ca
Kappa V	Ligoplex Mg
Kappa V +	Linea Phoska Max (reg. SIAN: ISSIK)
Kappabrix	Linfor V
Keliron Top	Liquame
Kelpak	Liquame biogas
Ken	Liquame separato – frazione solida
Keylan Fe	Litoman Ultra
Killer Frost	Lower 7
Kiraly Fe G	Lysodin Veg
Klozer	
Kohlensaurer Magnesiumkalk 95	Macht SF
Kriss Biologico	Macys BC 28
Kynetic4	Madeira
Kytos LG	Maganit
	Magasul
Labifol Movical	Magnesio solfato LG
Labifol Resulta 18-16-18	Magnesiogreen Attivato
Labifol Spydona	Magnesium 16 PG
Labifol Sugar-K	Magnisal
Labimancin	Magnisal Prills
Labin 10-10-40	Magnital
Labin 18-18-18	MAGyK ZM
Labin Materia Organica 84%	Mainstay Calcio
Landamine Cu	Maior 0-42-50
Landamine Zn	Maior plus
Laphrassea	Mangan 10 LG S
Last N	Mangan 32 PG
LAT Complex 14/10/20+11SO ₃	Manganese 134
LAT Complex 15/15/15+8SO ₃ +Zn	Mango
LAT Complex 20/20+8SO ₃ +Zn	Manna Horngrieß
LAT Complex SOP	Manna Lin A
12/12/17+3,5MgO+13SO ₃ +B+Zn	Manna Lin B
LAT Complex SOP	Manna Lin K
15/5/18+2,5MgO+24SO ₃ +B+Zn	Manna Lin M
Leaf K	Mannafert V
Leaf P-Ca	Manni-Plex Ca
Leaf-Fall	Manni-Plex Multi Mix
Leafix	Mantrac Pro
Lebosol-Ferro Citrato	Manygrow
Lebosol-HeptaEisen	MAP Arpa Speciali 12-61
Lebosol-HeptaKupfer	MAP solub
Lebosol-HeptaMangan	Maral NPK
Lebosol-HeptaZink	Maral Zn/Mn
Lebosol-Kalium 450	Maxflow Ca
Lebosol-Magnesium 400 SC	Maxi Plex TF
Lebosol-MagSoft SC	Maxical
Lebosol-Manganese 500 SC	Maxifrutto
Lebosol-Silizium	Maxilife
Lebosol-Zinco 700 SC	Mazinca 140
Lemon Jac	MC Cream
Letame bovino	MC Extra
Letame ovino	Medeo

Megafof	Natural Wax Mn-Zn
Meta	Naturblack
Metalosate Multiminerale	Nature
MG85S	Naturgipskorn
Micosat F Len	Naturgrena
Micosat F Mo	Naturgrena Life
Micosat F Tab Plus	Naturgrena Plus
Micosat F Uno	Nectar Intense
Micoter Attivo Sol	NEM 2 (furos twin)
Micotric L	Nemakil 330
Microspeed 130	Neo-Man 500
MicroSync Ca-Zn	Neobit New
MicroSync Fe	Neotrem
MicroSync Mn	Neutral
Microweed Calcio	Nevio
Microweed Ferro	Nevio Bio
Microweed Magnesio	Newcal
Microweed Manganese	Nippon NK 13-46 cristallino
Microweed Zinco	Nippon NK 13-46 granulare
Microzin	Nitracid
Minus Calcio	Nitrophoska Perfect
Minus Ferro	Nitrophoska solub
Minus Multi	Nitrophoska Special
Minus Rame	Nitrophoska Super
Mirante	Nitroplus Stoller
Mitsei	Nov@
MKP Arpa Speciali 0-52-34	Nov@ GR
Molex	Nova Calcium
Monafos	Nova Ferti-K
Multi Ca	Nova MagPhos
Multi-K Agri	Nova MAP
Multi-K GG	Nova N-K
Multi-K Prills	Nova Peak
Multi-Max	Nova PeKacid
Multicote AGRI 13.5.21+Mg+S	Nova Potassium
Multicote AGRI 15.6.31+Mg	Nova SOP
Multicote AGRI 16.21.21	NovaTec Classic 12-8-16
Multicote Agri 5.7.21 + Mg + S	NovaTec Nitroriz 32
Multifeed 14.7.28+2MgO	NovaTec Premium 15-3-20
Multifeed 20.20.20	NovaTec Solub 21
Multifeed 20.5.10+2MgO	NPK (MgO-SO ₃) 12-6-18 (4-17)
Multifeed 21.11.21+2MgO	NPK (MgO) 13-10-12 (3)
Multisei NT	NPK 12-12-12
MycoUp	NPK 15-5-20 Micro
Myr Calcio	NPK 20-10-10
Myr Clorosi	NPK 9-6-18 Micro
Myr Ferro	NPK Original Gold
Myr Magnesio	NPK Performance 5-7-14
Myr Potassio	NPK Performance 9-7-14
Myster Vegetale	Nutex Beta
	Nutex Mag Plus
NAC 27 N	Nutrakil
Nadir	Nutriactiva 4-4-12
Nano T Cu Bio	Nutriactiva NP 5.30
Nano.T	Nutriactiva WP Argentum BTC
Nano.T CaPO	Nutriactiva WP Aurum BTC
Natural Force	Nutriactiva WP Folium BTC

Nutribio N 10 Special
 Nutricomplex 18-18-18
 Nutricomplex 8-24-24
 Nutricomplex Arancio 7-12-40
 Nutricomplex Azzurro 13-40-13
 Nutricomplex Citrus & Fruits
 Nutricomplex ennepi 60
 Nutricomplex Rosso 15-5-30
 Nutricomplex Verde 23-6-6
 Nutrisan 12.20.30
 Nutrisan 14.40.12
 Nutrisan 20.20.20
 Nutrisan 20.5.30
 Nutrisan 27.15.14
 Nutrisan special
 Nutristart
 Nutriter vigneto e frutteto

Oasi Gel
 Oasi Gel Life
 Oasi Gel Sprint
 Oasi Melo
 Obstkorn Blau 12-12-17
 Obstkorn Plus 15-5-20
 Obstkorn Super 20-5-10
 Omistar
 OmyaPro Calcium
 Optycal
 Orgacote Starter
 Organ Star
 Organagro
 Orosoil
 Orostim
 Oscorna Horngriß
 Oscorna Hornspäne
 Oxy 380 eco

Parade
 Patentkali
 Pentac-5 Ala
 PentaCalcium
 Perfosfato semplice
 Perfosfato triplo
 Perlka
 Pharmamin M
 Phenix
 Phos 60 EU
 Phos-Phik 0-30-20
 Phosfik Ca
 Phosfo PK
 Phoska-Max 30-20
 Phostrate Ca
 Phostrate Mg
 Photon SG50
 Phylgreen
 Phylgreen Kuma
 Phytofert

PhytoGreen-BioBooster
 PhytoGreen-Calciumborate
 PhytoGreen-CalciumCarboxylate
 PhytoGreen-FruitColour
 PhytoGreen-FruitCombi
 PhytoGreen-Mg500
 PhytoGreen-Mn27
 PhytoGreen-Molibdeno
 PhytoGreen-Succo d'alga
 Phytonik Plus
 Pical-Max
 Plantafol 20.20.20
 Plantafol 5.15.45
 Plantech
 Plantflor 400
 Plantosol-N65
 Pocho
 Polis
 Pollina pellettata (TerComposti Spa)
 Pollinamatura
 POLY-FEED 11-42-11+2MgO+ME
 Poly-Feed 11.44.11
 POLY-FEED 12-18-27+2MgO+ME
 POLY-FEED 14-7-28+2MgO+ME
 POLY-FEED 15-5-30+2MgO+ME
 POLY-FEED 16-6-31+2MgO+ME
 POLY-FEED 18-18-18+2MgO+ME
 POLY-FEED 19-9-19+2MgO+ME
 POLY-FEED 20-20-20+ME
 POLY-FEED 26-10-16+ME
 POLY-FEED 26-12-12+2Mgo+ME
 POLY-FEED DRIP 14-7-21+ME
 Poly4
 Polyfeed Foliar Accrescimento
 Polysulphate Granular
 Poni cristallino
 Poni granulare
 Power Soil
 Power Soil Fe
 Pratiko 21
 Prodigy Plus
 ProLiq Calcium LQ
 Pushy

Qrop K Plus
 Qualical 250
 Quicelum
 Quik-Link

 RA.AN 13156
 Rame Zolfo Plus
 Ramos
 Red
 Red Ball 12.6.15
 Red Bloc SW
 Red Radicale
 Red Skin LG

Repente	Spray Plus
Reploid Frass	Sprühdünger Tipo 21
Resistar	Sprühdünger Tipo 26
Resolve	Sprühdünger Tipo 27
Rewind	Sprühdünger Tipo 30
Rexolin Q48	Sprühdünger Tipo 5
Rheobor FL	Stallatico pellettato (TerComposti Spa)
Rhyno	Starblend 12.36.12+2MgO
Rumisan Stabilized	Starblend 12.6.21+5MgO
	Starblend 18.18.18
S3 Rinverdente	Starblend 22.5.10+4MgO
Scudo K	Starsoil
Seaweed Grow PK 15-32	Steric K DS
Seaweed Mix	Steric P DS
Seiland	StickUp Demetra
Sequestrene Life	Stimulante Plus
Sequestrene NK 138 Fe	Stimulase S
Sequifill 6.0 TSS	StyriaFert N+
Sferosol	StyriaFert NK Pellets
ShutCrop L	StyriaFert Veggie DE
SIC Phoska	Subest
Silacon	Sugared
Silforce Eco	Sugarplex Reflexo
Siliforce	Sulfon SC 700
Siltop evo	Sunred
Silver	SunStop LG
Siveg GR	Super Humus
Soil Pro	Superbios liquido
Soil Pro 2.0	SuperCalibro
Solar Calcium nitrate	Superstallatico
Solar MAP	Supreme Ca
Solar Potassium nitrate	Supreme K
Solfato Ammonico	Supreme N
Solfato Ammonico – Petrokemija	Supremo L 101 B+Ca
Solfato Ammonico Arpa	Supremo L 262 Mn+N
Solfato di Potassio 50+44 SO3- Pastorelli	Supremo W 10-50-10
Solinure FX 13-40-13	Supremo W 15-5-30
Solinure FX 18-9-18	Supremo W 20-20-20
Solinure GT 20-20-20	Supremo W 8-17-41
Soluplant 12.20.24+2MgO	Sweet
Soluplant 12.36.12+2MgO	Symbiomyco Grow
Soluplant 12.9.35+2MgO	
Soluplant 15.5.30	Tangerkast
Soluplant 18.18.18	Target Plus
Soluplant 18.6.26+2MgO	Tayson
Soluplant 20.10.20	Tellus
Soluplant 20.20.20	Terium
Soluplant 20.5.10+2MgO	Terra 33 5.10.18
Solupotasse	TerraMadre
soluSOP 52	TerraSana
Solustar Mg	Thiomax S
Solvero	Tifi
Sonar 7-15	Tixyl
SOP solub	Topstim 66
Soybils@	Tradecitrus
Speedes	Tradecorp Cu
Spinab Bio	Tradecorp Fe

Tradecorp Mn	Vertyplus
Tradecorp Zn	Vhera
tradefer	Vhera Life
Trafos K	Vhera MB
Trainer	Vignafrut MB
Tri-Start Mega	Vit-Org VG
Triash	Vitalcombi
Tribù	Vitalfosca L
Tricho	Vitaltrek
Turi-L	Vitalumi
Turn-on	Vitalumi Star
	VitaMel – Bio
Ultraferro	Vitanica Si
Ultrasol 11.42.11+2MgO+TE	Vitastim Top4
Ultrasol 12.18.27+2MgO+TE	Vitelice P
Ultrasol 13.5.30+2MgO+TE	Vivema Soil
Ultrasol 18.18.18+2MgO+TE	Vulcano
Ultrasol 24.6.12+2MgO+TE	
Ultrasol K Plus	Welgro Mar
Umienergy 16	Welgro Potasio
Unik Mix 7-8-13	Welgro Standard Plus
Unik Mix 9-6-21	Welgro T.20+Micro
Uniko 25,5	Werthy
Unimar	Whitch
Uniphos K	Wuxal Aminocal (vegetale)
UnIron Plus	Wuxal Boron
Unisol 10-40-10+2	Wuxal Calcium Suspension
Unisol 15-5-30+2	Wuxal Combi Mg
Unisol 20-20-20	Wuxal K 40
Unisol 24-6-12+2	Wuxal Manganese
Unisol 8-12-38+2	Wuxal Super
UniZim	Wuxal Top P
Urea 46 – Petrokemija	
Urea 46 N	Xedalig-Fe
Urea 46% prilled	
Urea Rumisan	YaraAmplix Actisil
Urikane Flash	YaraBela Extran 33,5
Usbergo	YaraLiva Tropicote
	YaraMila Nutriplus
Valagro EDTA Cu	YaraMila Oro
Vangog	YaraMila Partner
Vegafoil	YaraMila Power
Vegand	YaraMila Rubino
Veganofluid	YaraMila Ultra
Vegastar 3.5.12	YaraSuna Rigenara
Vegastar 4.9	YaraSuna Riserva
Vegenergy	YaraTera Amnitra
Vegetal B60	YaraTera Calcinit
Vegetal Red	YaraTera Krista K Plus
Vegetal SD	YaraTera Krista MAG
Vegex Crisoil	YaraTera Krista MAP
Venta 4-7-15	YaraTera Krista MgS
Vera Pollina	YaraTera Krista MKP
Verdenta	YaraTera Kristalon Blue
Verdenta VG	YaraTera Kristalon Lilac
Verdero	YaraTera Kristalon Orange
Verian	YaraTera Kristalon Special

YaraTera Kristalon White
 YaraTera Kristalon Yellow
 YaraVita Balance
 YaraVita BioMaris
 YaraVita BioNUE
 YaraVita Calliv
 YaraVita Coptrel 500
 YaraVita Frutrel
 YaraVita KombiPhos
 YaraVita Magphos
 YaraVita Manliv
 YaraVita Optivi
 YaraVita Seniphos
 YaraVita Stopit
 YaraVita Zinliv

YAS 20-20-20
 YAS 8-5-42 + 2MgO + Micro
 Zacate
 Zeolitite Zem70
 Zeorame Micro
 Zeover Ammendante
 Zeus
 Zinc 10 LG S
 Zinc fast
 Zinco 134
 Zintrac 700
 Zn-Golden-Biotrissol
 Zolferro Energy
 Zolfo granulare – Manica

Corroboranti

Bicarbonato di sodio Green Has Italia
 Bicarbonato di Sodio Serbios
 Caolino Agri (Veneta Mineraria)
 Caolino Bitossi BPLN
 Crysil SC
 Distillato di legno
 Estratto integrale di castagno a base di tannino
 Green Has Italia
 Gel di Silice (Kalos)
 Green C
 Mastro 50
 Olio Vegetale Supercote Technology
 Polvere di roccia (BioKimia)
 Polvere di roccia (Cifo)
 Polvere di roccia (Compo Expert)
 Polvere di roccia (Sala)

Polvere di roccia Chabasite Green Has Italia
 Polvere di roccia-Caolino-Surround WP
 Power C
 Propoli Lea
 Propoli Serbios
 Propolis (Nuova Sunchemical)
 Sapone molle di potassio
 Silgreen
 Terios Liquido
 Terios Top
 Zeolite 95 Serbios
 Zeolite Bitossi
 Zeolite Fertenia Micronizzata
 Zeolite Fertenia Micronizzata
 Zeover Corroborante
 Zeovitan

Sostanze di base

Basei Lec
 Carpet
 Cimex
 Color
 Compact
 Emy
 Equiset
 Equisetum arvense (Seipasa)
 Invelop White Protect

Naturdai Carbobasic
 Naturdai Equibasic
 Omyca
 Plan Tonic
 Pomaplus
 Terra
 Urtribasic
 Valesco
 Verde

Cure colturali ecologiche



Durante un'annata agraria nell'azienda agricola devono essere adottate almeno due pratiche colturali elencate in questa lista. Le cure colturali applicate devono essere segnate nel quaderno di campagna.

Aree di compensazione ecologica e cura dei dintorni del frutteto

- Almeno in un frutteto si trova uno stagno con una superficie minima di 50 m².
- Almeno in un frutteto è presente un albero d'alto fusto.

Scelta varietale e sistema d'impianto

- Nell'azienda è presente un frutteto con una varietà resistente alle crittogame.
- Nel nuovo frutteto è stato scelto un sistema a fila singola.

Concimazione e cura del terreno

- La concimazione azotata è avvenuta in funzione di una prova N-min.
- Almeno in un frutteto è stata eseguita un'analisi fogliare precoce.
- Almeno in un frutteto la striscia lungo il filare degli alberi è rimasta inerbita per tutto l'anno oppure è stata coltivata con delle cure colturali alternative escludendo gli erbicidi.
- Almeno in un frutteto è stata eseguita una pacciamatura a file alternate.

Irrigazione

- Il controllo dell'umidità del suolo è avvenuto mediante tensiometri o altri strumenti di misurazione.
- Almeno in un frutteto il fabbisogno di acqua è stato coperto attraverso l'irrigazione a goccia.

Cure biologiche o biotecniche

- Nelle zone colpite dai maggiolini sono state utilizzate nei frutteti le apposite reti.
- Contro la carpocapsa, la cidia del pesco, i ricamatori o il rodilegno giallo è stato applicato il metodo della confusione.
- Per la difesa contro la sesia sono state approntate le trappole con liquido attrattivo.
- Per la cattura massale delle carrughe degli orti sono state approntate le trappole.
- Per la cattura massale delle mosche della frutta sono state approntate le trappole.
- Almeno in un frutteto sono stati distribuiti dei nidi per favorire l'insediamento delle cinciallegre.
- Almeno in un frutteto sono state approntate delle stanghe per la sosta di uccelli rapaci.
- Almeno in un frutteto sono stati preparati dei nascondigli per il riccio, il topo ragno, i serpenti e la donnola (mucchi di sassi, tubi e mucchi di rami secchi).
- Almeno in un frutteto sono stati immessi i fitoseidi.
- Per la difesa contro l'oidio e gli afidi sono stati potati i rami colpiti.

Controlli degli insetti dannosi

- Nell'azienda sono state distribuite le trappole a feromoni e sottoposte a controlli regolari delle catture.

Riduzione della deriva

- Per ridurre la deriva sugli appezzamenti confinanti è stata messa a dimora una siepe.

Diradamento meccanico

- Il diradamento è stato eseguito meccanicamente con la spazzolatrice.